

M<sup>s</sup> n<sup>o</sup> 43  
(anc. n<sup>o</sup> 13)

III



Ms n° 45  
inc. n° 13

manuscriptum 2<sup>a</sup> manus  
rara inbibula

ENSURE ~~Physica~~ <sup>Physica</sup> ~~chemica~~ <sup>chemica</sup> ~~Physiologica~~ <sup>Physiologica</sup> ~~Historia~~ <sup>Historia</sup> ~~Naturalis~~ <sup>Naturalis</sup> ~~Anatomica~~ <sup>Anatomica</sup>  
Morbida 17<sup>20</sup> 36 Index appensa indicabit Contenta

Historiarum anatomicarum morborum. potissimum  
17<sup>27</sup> 42.

A. A. ex quibus collegi.

Regie Scientiarum Academiae Historicae.  
Per Joan. Baptista DuRoi. Paris. 1698. 4°

Philosophical Transactions  
Hales. Statistick & Hamarsteds.

Brisseau. six observations, alafin du ii tom de  
l'Anatomie chirurgicale de Balfin. de l'edi-  
tion de Paris 1734: 8° 2. vol.

Ind. Ruych. observations Anatomiques & chirurgi-  
cales au nombre de cent. trad. par D. M. Paris.  
1734. alafin de l'Anatomie chirurgicale de Balfin.  
fn. 2. vol. 8. Paris.

Comae Bartholom. <sup>Medicorum</sup> <sup>Physica</sup> <sup>Chirurgia</sup>  
ensia an. 1671: & 1672: Hafniae

1673.  
Musei Imperialis Petropolitani. vol. 1. Pars 1. qua continetur  
des naturales ex Regno Animalium. Typis Academicis Petropoli.  
1741: 8° / continet praeparata <sup>dyuchana</sup>.

Nicolaus Culpus observ. Medicae. Amstelod. 1672. Elbavir.


Histoire de l'Academie Royale des Sciences  
depuis 1666 & Suivant 4° Paris.

Bonetus Sepulchreum Anatomicum in tres tom.  
Genesae 1700. fol.  
& Multorum, quos hoc opere leges

Collection

des Remedies, copies du 3<sup>m</sup> volume des Oeuvres de  
N. Boyle, abreges par M<sup>r</sup> Peter Shaw. 3 vol. 4°  
London





Mon. 43 (anc. n. 13)

Index fidei fides

Memoravis

Na.

Phyica, chemica, Historia

Natural. Anatomia

17<sup>20</sup> 36. P. B. B. B.

ad versum. tom. 1.

Index Anatomiae Morbosa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

avoir pressé & ject le jus font non seulement du pain, mais aussi le pain ils tiennent tout le jus de la racine, ensuite ils le lavent & la grande torteaux, qu'ils cuient au four, & c'est qu'ils appellent caf. Ensuite ils prennent ces torteaux secs, & les détrempent dans l'eau la plus propre: cette pâte cuite ainsi avec l'eau devient sion, qu'elle enivre comme fait notre vin. Relation de la Rivière voyagé 1633





Arteriae — 14.

Arteria aorta — 16.

Aspera arteria. 20.

Arteria Pulmon. 15.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Z

Cinures loco Salis <sup>Comm.</sup>

fol. 2.

Cerebrum: ~~non sine cerebro~~

8: 19: 83.

Calculus humanus --

3

~~Cerebrum~~ 19:

Cartilagineus 20:

Caro 20:

Cutis: 21

Cor: 22

Cranium: 69:

Cerebellum: 23

Caput. 24

Conceptus foetus prout  
naturam. vide

Uterus

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

Diaphragma: 25

Dura Mater: 26

Verres: 66

Ducy Kersey p. 74

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

Epidermis: 27

Epiploon: 28:

Epiglotidij vliet: 32.

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

7  
Fermentatio ——— fol. 1  
Frigus comprimit, & in aqua  
dilatatur. ——— 3.

Foetus in abdomine in  
ventru intra-uterum pag. 89

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

Gravitas, mineralia igne. 4  
violetta evadenda 3

Generatio fructuum — 7

Glandulae: 29

Generatio: 76

Glanglion. 79.

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

Hepar. 30.

Harmattan. vide —

Kenang Lontang.

pag. 35

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z



Intestina . 31

Intestinum duodenum . 31:

— Ileum . 32:

— Colon . 33:

— Rectum . 68 -

— Cecum . 15

Irritabile partes

Corporis . Vid. MS.

de Mby Melancholy.

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

Lymphatica vasa. 34:

Lien: 34:

Linguae cancer. pag 88

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

Membranae: 35

Musculi: 36:

Mesenterium: 37:

Mammæ: 38

Medastinum: 39:

Medulla oblongata: 41.

Membrana Vitræa: 35.

Membrana Cellulosa pag. 35

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

Nervi 42.

Nares 64

43

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Z

Ova: 43:

Ovaria: vid. Uterus.

Oesophagus: 44:

Oculi: 45

Omentum: 28:  
vid. Epiploon

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

18  
Pinguedo: 46:

Pentastaceum: 47:

Pancreas: 48:

Pleura: 49:

Pericardium: 50

Pulmo: 51.

Uterus: 52

Pylorus: 57.

Peritoneum: 71:

P

R

S

T

V

X

Z

Pis

Penes: 53

Succenturiat: 53.

Respiratio Lasa .. vnd p. 83

R

S

T

V

X

Z

Saffed mory

Spinatis medulla: 54:

Sinuy. maxillari. 55:

frontalis. 72

Suturæ delecta. p. 80.

6

18

S

T

V

X

Z



Toties: 56:

Tubae Fallopianae: 75

Thymus: 78

T  
U  
X  
Z

19  
Vegetantia — fol 10  
Uterae — 16:  
— vena cava — 16  
— portar. 17  
— lactae. 77.

Ventriculus: 57.

Vesica urinaria: 67.

Vesica felle: 58:

Vreteres: 59:

Ventre: 60

Vesiculae Seminales: 60.

Uterus: 61

... ovaria: 62

... tubae Fallopii. 63.

— vagina — 61.

Valvulae cordis: 65

Umbilicus. p 81:

Ventus Deglutens Afflic pag 35

V  
X  
Z

20

ui  
le  
de  
b  
le  
at  
e v

27



22

lui  
e le  
+ de  
du b  
li le  
ntat  
lon ve




lui  
e le  
de  
le b  
le le  
stat  
on v






§ Les Américains de la racine Yuca après lui avoir pressé & jecté le jus font non seulement du pain, mais aussi un liqueur comme le vin. Pour faire le pain ils tiennent tout le jus de la racine, ensuite ils la lavent & la réduisent en poudre : de cette farine ils font de grands torteaux, qu'ils cuisent au feu, & c'est ce qu'ils appellent cafava. Quand ils veulent faire du breuvage ils prennent ces torteaux secs, & les détrempent dans l'eau qu'ils font bouillir après feu, tant qu'ils le jugent à propos : cette pâte cuite ainsi avec l'eau devient une boisson si volatile par la fermentation qu'elle enivre comme fait notre vin. Relation de la Rivière des Amazones par le P. Acuña dans son voyage 1639



Cinere loco Salis communis moricea

Les Indiens du côté de la rivière des Amazones accoutument de se servir pour sales de Cendres faites d'une certaine  
Sorte de palmier. Acusia dans la relation qu'on en a.




Dictionarij R. S. A. Hist. anno 1667. fol. 12. ait

§. Illud enim palam est omnia pene corpora frigore contrahi, ut caloris vi dilatantur. Sed Aquam solum frigus  
 = distendit: hinc glacijs aqua innatat, quod pro mole sua sit hevi. Contra oleum frigore contrahitur, et gravius  
 = in liquidum oleum descendit. Vinis Spiritus in thermometro multum contrahitur: sed aqua congelata distendit tubos  
 = et vasa quibus coarctetur. D. Hugenius 1656-67 Cum sevirer hyems acerrima tubum ferri sclopeti in dug  
 = partes secari atque unius extremum ferruminari jussit: tubi aqua repleti alterum extremum cochleæ ope vi  
 = adacta occlusit, ac ne aëri ullus pateret accessus, liquorem plumbum superfundit ad feryeram sui cubiuli gelido  
 = aëri tubum nocte exposuit, qui circa horam septimam matutinam crepuit magno cum strepitu, ac fractus est in ea  
 = parte, quæ minus firma erat, et crassa. Rima quatuor in longitudinem pollicum visa est, per quam glacijs variis bulk-  
 = hi in sui medio distincta erupit. § Experimentum in parte altera tubi iteravit, qui eodem fere modo dirup-  
 = tus est.

§. Vtrum aquæ particulae, dum frigoris vi rigee fiunt immobiles, nec tam apte alijs alijs incumbant, quam ubi mo-  
 = tu ingenito cident, tum animi facilius fluctantur, ac pressioni aëris, aut aliarum aquæ partium cedunt?  
 = An potius aër potius aquæ conclusus in varijs bullulis distenditur, quæ in glaciem per rimam sclopeti exant e-  
 = vult. Vnde, quod acircumfusa aëre minus premantur? alijs excutendum relinquimus. quamquam illud ipsum  
 = diluicari potest experimentis quæ D. Hornberg anno 1692 in sua machina Pneumatica. nobis comen exhibuit....  
 = Cuiusmodi puto esse quod in aqua aër est: Et quando aqua congelatur comprimantur aëris globuli, qui Coniuncti  
 = iam superant resistenciam atmosphæreæ, et tunc diffingit vase primo, postea aqua exiit, tanta, quanti adhuc sunt ad-  
 = ris globuli in ea inclusi.


Braville necibus æstivis frigui insensum; hiemis, quæ murem, mitem presentantur. Rivo Cap. 1. lib. 1.



Du Hamel. Anno 1667. p. 13


Valgo persuasum est corporibus maius pondus non accedere, nisi semibilibus aliisq; materia. fide acceptio.

- § Du Clos. libram unam reguli antimonii in marmore trisi, in tenuissimū pulvēm contriti vase fictili  
 & plumbato impositam radiis Solaribus exposuit, atque ope spatuli vitrei hanc materiam incendit, adeo ut  
 fumus albidus, & densus erumperet: pulvis in cinerem redactus post horam integram  $\frac{1}{10}$  prius pondoris  
 parte auctus est: pulvis quo tenuiter citius inflammabatur, & ponderosior ferebat gravior apparebat.
- § Regulus antimonii cochleari ferreo impositus  $\frac{1}{8}$  sui parte factus est gravior.
- § Limatura cupri rubri Unciæ 8 limatura ferri 4 unc. tantundem auri pigmenti crucibulo im-  
 ponit. tartari in pulv. redacti 3 ii superfundit alio crucibulo, & inverso prius operuit per octo horas in  
 furnulo, quem cementationis vocant, aucto per gradus igne tartarum dicitur Crassius nigrum &  
 calcinatum apparuit; eo sublato hec mineralia quatuor unciis graviora reperta sunt, adeo ut  
 auri pigmentum, quod ignis calore minui solet, tartari ope fixum evaserit, & per  $\frac{3}{4}$  hore igni  
 admittam  $\frac{1}{5}$  fere sui ponderis parte increvit.
- Causa est fomentis particule, quæ intra mineralia se recondunt: etiam aeris particule.






Brasiliæ ros pinguior & corrosivo sale multo imbutior, quam Europa, quia ferrum. Kralyua rōdit mesellā pro ser  
aliq. many soliday materiy. Eus. p3



*Brasile mare salisq est quam septentrionem versu . p. 3 Pto*



Generatio Fructuum

32 Z

Brasilia fructus Guajacorum, seu Guajacorum arborum Semel per biennium.  
Fructus arboris Barbae, sive Guajacae Brasiliensis vix per quadrimum producantur } p. 5. P. 10

# Generatio

Albinus Professor Anat. Legde contra vtrum esse generatioem effecientem inveni-  
tur; & tendum pro aut. Seminari. contendit.

1742

Per auram  
Seminalem

= L'occasion d'abjurer lui a été donnée par une certaine petite fesse aquatique qu'il a mis dans l'eau, & en la regardant on vit d'abord une autre qui sort d'elle, il va transporter cette nouvelle, dans une autre vers d'eau, il la regarde un peu après elle se trouve aussi grande que la mère, & peu après cette bête va à coucher, il transporte en core cette dernièrement produite, & elle va faire la même chose, & comme ça il a vu la propagation plus de 100 fois: M<sup>rs</sup> Albinus après tout on il peut contre-carier & harceler Bayle le fait: Boerhaave selon temps, (comme vous savez) a été fort pour l'infélibilité de Bayle. Sic tempore mutatur & nos & partu d'une lettre de M<sup>r</sup> Ens disciple d'Albinus datée à 5 Juin 1742 à M<sup>rs</sup> Le Dr. Fonderi, qui me l'a com-  
muniqué) on ne conçoit pas comme de cette observation on peut conclure ce qu'on avance: mais par  
trouve après de la copie pour donner adon tout l'esprit à cette explication.

Philos. Transact. abstr. tom. 3. p. 24. n.º Crayack 226

Natus fuit infans vixit sine Cerebro: hujus loco erat aqua rubra sanguis ve dilutus limice, tanquam Si vel Dura Mater investitur: Medulla Spinalis erat, sine qua vivere animalia non possunt: ibi narratur D. Hallerney cerebrum Columbus absculisse, & lino crudo implicasse & per parvum tempus vixisse adhuc: ita D. chirac canibus Cerebrum & Cerebellum detrahebant, foliis aer pulmone servabatur & vivebat aliquandiu hæc animalia at sine Spinali medulla vivere nequit ob rationis ibi allegatas.

Ex Memoris Academ. Reg. Chr. Par. tom. 1. p. 227.

fingij  
canonij

Scieny puella dolere capiti vehementissimè per VI anno tota, post varia ex arte medicæ remedia ad ministrata ad arteriotomiam devotum est, sed frustra: ad trepanum dante: neque ultra vasa, velly inventus humor, neque dura mater læsa. hæc post aliquot dies lecta, sed frustra omnia nova solum immensio cruciabat. 8. post trepanum mors.

Cadavere tres fingi magnitudine pidi omni incorticali substantia cerebri trivulcenty dura materi adherenty, quæ hic loci valde crassa erat: Contra cranium, quod valde tenue erat & chorioa in cravie aquale: eo in loco ubi fingi respicebant. Verticali superioris aqua pleni: testibus clausis aro pleny: Implexæ Choroidæ glandularum forma semij genyæ amulenty appendent vltus in superficie cerebelli, quod ad profunditatem trium linearum se extendebat in cerebello pro.

Abusus  
viti.

ibid pag. 320 & seq.  
Historiæ referuntur abcessuum multorum cerebri, Grazeandæ, Cancerorum, quæ male per delo res avidos acies, paralytic lateris oppositi, febres, convulsiones manifestantur: ibi per experi menta demonstratur posse Cerebrum scindi apertis, Secari, postquam trepano Cranium, & ma ninges sectæ & apertæ fuerint.

Observatio cancri cerebri post mortem inventi pag. 324  
Observatio gangrenæ ————— pag. 325

lucij & aliquando epilepsia tentatus: sed mente consistat pag. 325 & seq.  
Ex observatione Anatomiquy dy cadavory. Par Dume Barrere. Perpignan. 1751. 4.º

Neuralgia

moeror.

vide pag.

15. sub

arteria

capiti

Ob. 1. Mily factus hebet, melancholicus, ex hero cadens insensy: Oberv. 11. alter morat. ga ut primus, tristis dependens animo, melancholicus, macis, tenuisq.  
Incadaveribz virisque; vasa cerebri turgida nigra: in 1.º 3.º ventriculy aqua pleny, glandula pituitaria turgida inflata: in 2.º in sinu longitudinali polypus: in vtroque, polypus dextri: felix vesica distenta felle bile spua mustelini coloris. In alij Observatione pi Cordy dextri: aqua intra pericardium, & in pulmone cavitate:  
IV pag. 13. ibid, aqua intra pericardium, & in pulmone cavitate:  
Vnde moeror, dependens animi, melancholia: producit polypus: bily congestions, clonum in cavitatibz cerebri, pectory pericardii.

Ob. 1. Mily, qui ob imminentem ad tristesq. poenam, damnatus, melancholicus delirus,

Oberv. 1. Mily, qui ob imminentem ad tristesq. poenam, damnatus, melancholicus delirus,

in cadavere inventum Cerebrum sicum: ventriculo vtroque Cordy polypus

Oberv. 2. pag. 19: ex angore & moerore ob denegatam demissionem, Mily febricitans, & moeror, moeror: Cadavere: inventum Cerebrum sicum in nigrum vergens, turgida, flava: polypus pinguedinem seu lardum emulans ventriculo dextro Cordy.

Oberv. 2. pag. 23.

Abcessus ibid Oberv. 2. pag. 23. aorto tumore puy exit: coarctum carotum inventur: Talpa in vltima capiti appont: aorto tumore puy exit: coarctum carotum inventur: Trepano opuy exit: Subsequitur diarrhoea moritur: cadavere: puy intra Cranium.

Subsequitur diarrhoea moritur: cadavere: puy intra Cranium.

ibidem Oberv. 1. pag. 27. Mily anidus dolentibz capity guly per tris menses: in unum remedia adhibita. pulvis parvus frequens: pallida facies: moritur: inveniuntur ventriculi cerebri antierog aqua pleni.

vide in dolentibz capity facie pallida, pulvis parvo frequente aqua vel in ventriculy anterioribus cerebri, vel in tertio cum polypo sinum lateralem, ut ostendit 11 Obervat ibid pag. 26

vide pag. 19. et Contra

Cephalea

polypus

bily spis

sa. multa

polypus


in vtroque

polypa

aqua

& polypus

any cerebri





Italy Hematiticks

Neque alcalina, neque acida, neque neutra solia, Selina, Sulphurea, Saponacea neque  
trina Calculum dissolvunt: tantum Spiritus nitri, qui valde corrodens est illud dissol-  
vit: Sed si in vesicam introducatur illam corrodet, laceraetque

Menstrua

Sunt tamen Menstrua quae metalla Hematiticks dissolvere possunt, quamvis illa cor-  
pori applicata minime illud corrodant.

Tartary destillatus maximam aeris copiam reddit: quod in aliis Corporibus non  
apparet, vel sunt mineralia, vel animalia, tanta copia

Tartary

Calculus humanus pondere 230 gr. magnit. poli.  $\frac{3}{4}$  destillatus reddit aeris 516

capia aeris in  
calculo.

Cubic. pollic. residuum erat 43 gr: ita ut aeris corpus esset maiori illo calcu-  
li 645 vice. Sed post aliquot dies illa aeris generati per destillat. elasticita-  
tas perdebatur

Tartarum urini rhenani parum olei per destillat. dat. Semina & Solida vegetabili-  
um non partium maiorem copiam: Ita calculus renum & vesicae paucum oleum

oleum in calculo

per destillat. & Calculus felleus maiorem

calculi fellei  
dissolvens.

Pars calculus felleus dissolvatur in lixivio Salis tartari per 7 dies: Nam tar-  
tarus dissolvatur; Sed calculus vesicae minime

tartarus dissolvatur; Sed calculus vesicae minime

Sp. nitri calc. &  
dissolvens.

Calculus renum pondere 115 gr. cum pollice uno Cubic. Sp. nitri dissolvatur in  
tra tres heb. magna spuma: aer generat erat 48 cubic. poli. elasticitatem

Calculus est tartar-  
us animalis: &  
Tartary est vege-  
tabilium.

tra tres heb. magna spuma: aer generat erat 48 cubic. poli. elasticitatem non semebat.  
Sed dabit: Sed tartary dissolvatur ita; Sed aer elasticitatem non semebat.

Est animalis tartarus, qui ita aliquotibus humanis separatur, sicut vulgaris tar-  
tarum per fermentationem fit a vegetabilibus: ambo hi tartari, videlicet Calculus

& tartarus in his coherenti: ambo separantur per expansionem liquorum, & la-  
teribus vasorum continentium coherenti: fundum non prestant, neque precipitantur.

Primo parte amborum tartarum lateribus vasorum affixe adhuc particulas, quae  
in liquoribus sunt, sibi semel: hi tartari pleniori corpora deponuntur ad latera

vasorum continentium, quando latera illa sunt semel incrustata.

Fluida quo magis sunt fermentata & tenuiora evadunt eo maiorem tartari copiam  
emittunt; ita Fluida animalia quo magis ad putrefactionem accedunt eo

maiores copiam tartari ad latera vasorum emittunt: Sui liquores sunt in vasis  
continentibus quietiores, & maiorem copiam tartari emittunt: Sicut vinum quod nisi

quiescent sit tartarum non emittit; ita Urina quo magis in renibus destinetur  
eo magis Calculorum copia incrementum, idem in vesica

Corpora, quae maiorem aeris inclusi sonant tartary est: unde maxima horum aetho-  
tion est; quia per hanc actionem Solide partes vegetantium & animalium fiunt.

Corollaria

Aliae Corpora quae magis in putredinem vergunt eo magis ad calculum sunt ef-  
formandum sunt aptiora; 2. Sui maior quies est in his maior copia tartari

in animalibus deponitur: hinc illi qui multum dormiunt, & sedent, ut infantes  
eo magis ad calculum sunt praei.

3. Deinde quo magis incubitur est ho-  
mionibus magis ren vix comprimuntur a ventre, & depressior est; ita Urina

non fluit ex rene illo; ibi sinitur postea quae in vesica iterum & calculum  
deponit: ergo Debilitas Capite & Membris Corpore elato melior est

Experimenti p. 213

Cope, cochlearia, Raphanus Rusticatus Singula contusa & olla separata  
inclusa: in medio cuiuslibet Massa inclusus fuit calculus durus: Singula

premebantur, & loco tepido per sedecim dies reposta fuerant: Explorata  
tandem

tandem calculi qui sepulti fuerant in raphano rusticano & cochlearia nullum decimen-  
tum passu fuerant; tantum illi qui in capis unduloy fuit, molles evadit. ut virgine ad  
maie posuerit: idem accidebat si calculus in succo cape aqua dilato macerabatur in  
Calore prope Caminam per 15 dies

#### Cochlearia

Hinc illi qui videntur apud in cibo si prorsus calculi non durabatur saltem non  
increscet. 2. Diuretica calculum non minuire, sed urinam expellendo & conten-  
ta utique adcretionem calculi impedire: Hinc omnia que alicuiusmodi humo-  
rum impediunt, & acrimoniam obdundunt non solum calculum generari impe-  
diunt, sed etiam faciem minuant: Hinc cerealia, herbe, mucilagines  
possunt: hinc femina, illi qui fibra laxa sunt calculo formandi apti  
non sunt: Hinc panis testu carnes ~~ad~~ tota morbum augent.

#### Experim.

Calculi in aqua egida macerati per longum tempus mucosa crusta evadit  
indurati. Si vero calculi in aqua pura cum urina mista macera-  
bantur tunc non dissoluebantur, neque multo apte tegebantur

#### Cochlearia

Hinc quo aqua puriore eo meliore & minus calculo generando apte sunt.  
Hinc urina quo magis retinetur eo magis ad calculi generationem & in-  
durationem conducit.

# Vegetantia. Ches collecta fuer, dam Betr pali fuit anno 1237.

Boeck. Chem. p. 57. prompli.

Est vegetans corpus. Hypochondria, ex variis vasis, variisque humoribus constans, quod parte quadam sua exteriori alteri corpori adheret, cuiusque haurit plantae materiam Nutrimenti, & incrementi sui.

de Bloate  
in genere

Si recte attendis ad varietatem formarum partium vegetantium, ad hoc morum Anteriorum diversam molem, ad soliditatem fluidam, non habes. Differentiam inter haec & foetilia. quoniam inter Animalia, si Contingens Radicem, quae pabulum in se trahit ex, cui committitur, terra. foetilia N.B. immo cito vocantur corpora dygnalica.

Principia Vegetantium sunt Terra & oleum tenax, quod vix dissociandum nisi agito ignis, haec oleo coniungitur, & denaturatur terra. Efficit plantae.

Sola Radix trahit in se Nutrimendum ex terra. exipe tuberos, & Callos terra, quorum superficies huic officio inserviant, oculis bibulis in omni superficie scaturit radix, per quae humor pabuli hauritur & hic per totam plantam molem deducitur. haec ca. oscula sunt tanquam vasa lactea, quae Chylum in se absorbent. cum vegetantia sunt inter aquam, aerem, & terram, quae Elementa in se recipiunt. Aquam, spiritum, oleum, Sal, necessario est ut igne artificiali vel naturalis agitentur, permisceantur, & denique radicibus plantarum applicentur. Humores plantarum in duos distinguuntur scilicet in humores crudos, & humores coctos. humores enim Crudi sunt illi qui nonnullum parvum plantae lactis fuisse, sed postquam terra Cal quae ignis visciditudo Caldi, fluidi, huiusmodi, & licet eos agitantur, promoveant quae tunc Cocti evadunt. Jondatur Cuius flos, Vitis, & emanabit liquor tenuis, aculeus. Ferit humor crudus. in racemis Uvarum prolat certo humor Coctus.

Radix.

Qui in foliis humores sunt, aeri, radii exponuntur, hinc per superficiem in Valde autem, maxime per permutantur, atque in naturam plantae propriam excoquenda, perficiuntur, verbo sunt folia tanquam pulmones qui pro ratione corpore laborant. Supra haec folia noctibus otiosi exsudet liquor, qui varia Norma accipit pro varietate plantae; tunc superveniente frigore, coeunt densate Colligi, ut fit Cum Maona, &c. &c.

Folia.

Humores qui in foliis fuerunt parvi, adhuc in florum Calice, petalo, Humine, & apice ulterius proficiunt, floris enim verum plantae Characterem imprimunt, atque Novae Embrioni signanda Conservando, optant, parant quae hinc inest de fragantissimis odor spiritibus, & ceteris, qui forte est genitali. Denotant Embrioni hanc visum, gratum odor. Ad Cotyledones & apices, Stamina vel unde quae exsudet, ad favos formandos, utuntur apes.

Flores.

In semine continetur plantae Embryo 3. placenta uterina, vel cotyledones, quod semini, simplex, duplex, vel multiplex, cui fune umbilicali Embryo connectitur. ha placenta Balisima valent, quod nihil aliud est quam oleum plantae elaboratum, immixtum est tenax humida arect, embryonem defendit, & verbo est hoc oleum illud Michemistum sp. Rector, sulphuris incal, & Archaeus &c. N.B. Non est hoc oleum fragile, stirpium fibris defendens, nam datur aliud genus in plantis, quod in Balsamum Resinam quae, per Caloris vim, moxam quae temporis facile permutatur.

Semen.

Cortex plantarum habet oleum lenius, simile membranae rebus.  
 Si animalium, deducit totum plantae corpus ne aqua dissolubili  
 gelaretur, hoc a loco adest ferre semper spiritus acidus, qui per  
 thesini resistunt. Cinnamomum, balsamum recedunt Cortex duo est  
 unguis. ex Cortex aut chemica varia sunt, nam hyber-  
 na tempestate multum olei Contract: contra diebus affinis aqua  
 sal, sapor in plantam ipsam transperit. quando oleum hoc  
 colligitur liquidum est, si Calorem solis subit tunc Balsam.  
 durum evadit. si Calore interiore tractatur hoc balsamum  
 tunc semirapinatum exit. si magis, ac magis augetur Cui  
 sit tunc illud oleum Naturam Resinae induit, quae spiritus Resinae.  
 acido magis orbatu est, in igne deflagrans, oleo misceatur, diffi-  
 liturque, in aqua dilui. robust. Visida nullam tenacitatem  
 oleum habet, friabilis fit. hoc resina si excoquitur dicitur  
 Colophonia fit, evadit, in hac deprehenditur aliq. huc Colophonia.  
 Cui, quod Gummi vocant, & est lenax, lenitum, liquidum, Gummi.  
 & deflagrans ad ignem, aqua dissolvendum. + Gummi Resinae  
 Confunditur aliquoties, ut videtur in Aloe Myrrha, & Galbano.  
 Gummi plurimis aliis, quae Resinam & Gummi una in se Contract.

+ Gummi Resinae una  
 Confunditur praecipue  
 in plantis Umbelliferis,  
 dictis.

Humores, qui in plantis Circulant faciunt sunt tempore sanguis  
 in Corpore humano, invenitur enim omni parte plantae ut in  
 Phloemae, & Xylemate. liquores quosque habent posse liquores, fit  
 in illis idem quod fit in animali Corpore. in Colylis petala-  
 rum floris Alos melliter invenitur liquor, dum amarefecit  
 succus de alijs partibus, in Radice, flore, fructu, semine, folijs,  
 Cortice, ligno, aliud invenitur humorum generis. praeter ea  
 differunt adhuc liquores plantarum, tenacitate sua, Harditie,  
 Hardities, Medietate, viribus, Venositate, Nutrientibus.  
 N.B. haec differentia humorum potest inveniri in una tota planta.

Ille, qui producit Chemia de plantis sunt spiritus Rector,  
 nihilaponacci, Salini, gummatosi in se habet. intricatus est  
 oleo. Antiqui dilebant, quod omnis odor ex spiritu Rectoris  
 proveniret. Canis Cognoscit Humorem quia distinguit spiritum  
 Rectorum ab alijs, Quinvenit illum suo Aere proprio?  
 2° Sal acidus. 3° Sal neuter. 4° Sal alcalinus fixus, vel vo-  
 latilis. 5° Oleum & saporis mixtum, ac sapor est. 6° Oleum  
 tenacissime tenore Aetheris difficile separandum 7° terra  
 denique cinerea, quae est forma basis Omnium?

Constant Vegetabilia ex solidis, aut fluidis partibus. soli-  
 da Vegetantium partes sunt vel vasa, vel Consistentes partes  
 Crassiores ex Vaporum concretorum adunatione Consistentes

Planta vasis suis libulis liquidiora absorbeat. vasa haec  
 in tota superficie apparent, sed praecipue in radicibus. Con-  
 trahuntur in frigore, & siccitate, dilatantur, in aere humido  
 & calido, inque terra iniqua & tepente. ipsam aerem humi-  
 ditate specie largiunt, cumque in partem fabricata plantae  
 deducunt.

Cortex.

Balsamum.

Semirapinatum.

Resinae.

Colophonia.

Gummi.

Gummi Resinae.

Succus proprius.

Production  
 Plantarum.

Plantar. partes

Plant. vasat.  
 1°  
 Absorbentia.

Sunt alia vasa plantis propria, quae moventia dicuntur. accipiunt enim liquores extrahi, absorbentibus & per omnes ptes ptes movent; obicitur talori, & figuris factis ut natur. effluvia, in fl. ad liquores promovendos. Plantae nullis volentibus in se habet quoniam plantae inversa semper flos nutrimentum hauriat, quod impeditur.

2.° sunt vasa Moventia.

Alia adhuc apparent quae Mutantia vocantur, & haec sunt vasa quae liquores accipiunt sic mutant ut singularem plantam naturam in

3.° sunt vasa Mutantia.

Demonsratur alia, quae sunt Combinatio praecedentium, liquoris singularem accedentem vel mutantium magis magis quae in proprium ingenium plantae, ut in illis ductus singularem, absque viguerant, qui liquorem vehunt quam distinctum ab omni alio humore. Illi alii vasa contenta, quoniam quae, in eadem illis talia sunt in talibus & Chelidonio.

4.° sunt accedentia vel Mutantia

Receptantur vasorum genus, quae receptacula dicuntur, in quibus recipiuntur humores illi qui transierunt per quantum vasorum genus, ductus, in receptaculis hiis, quae sunt perficiuntur quae.

5.° sunt Receptacula.

Porcum sunt lacus excrevantes, qui faciunt ut liquores elaborati sine extra fabricationem plantae corpus effundantur, quod fit aliquoties, factis cancellis, hinc gummi, orinas epice quae ignorat.

6.° sunt Excrementia.

Processus 1.°

Alia apponam omnia illa quae possunt adduci ex prescriptis Chemici Cl. Boech. Sed incipiam dico quod ex primo processu, qui fit Naturae visus est, quod est pro plantis, & pars quaeque vasa qui capi tot in propriis partibus. Ut hic res, nihil aliud nisi partes, liquor plantarum, totumque corpus sapientium, colore dicitur praecedenti excreta, & in plantarum felix concretis, una cum latice exhalant ex vasculis plantae astringuntur. in hoc liquore extrahitur virtus esse quod, Lemna vel alia corpuscula, quae tractu temporis formant aliam quandam, alii mucilaginem, quae liquorem deinde offuscant turbantque.

ROS.

Ex dictis constat liquorem extractum, distillatum ex plantarum odore celeberrimum, gratissimumque, ope ignis ad gr. 85. constare ex duabus partibus semper ex aqua, & spiritu Rectore. In hoc pendet sola vis Medica plantarum, nam ubi auferat, frigida aqua manet. Praeficit enim & nervos misce afficit praecipue Hypochondriacae Hypericacae cum Hyacinthum videtur inhaleant. Hinc quoque dicimus quid sit illud, quod venit in aere effuso in plantis: scilicet aqua haec, & sp. descriptus. Unde etiam videtur qualis sit natura liquidi, qui primus ascendit, inter distillandum. Unde & qualis sit peculiaris Materies quae odori speciem donat, non pro spiritu Rectore solus, docemur. etiam videtur quidam sint illa effluvia quae effuso maxime tempore Vegetantibus in auras exhalant.

N.B. deinde omnes plae  
eiciunt spiritus dictos; et  
hinc in flosculis gerantur  
postea, in hunc magis  
nifestos.

Abrotanum non opus est  
Ageratum trancheb.  
Allium in quadam  
Angelica parte 2.  
Asethum p. 14. propri  
Anisum tant. 4. p. 15.  
Aurastium v. II.

N. debemus itaque mirari si effecta stupendamur, ut  
fit umbra Anglandi quod ab his sint. halitus papaveris  
somnium dat, & Cortex Cornuarius solo halitu fertur, cu  
vraut intermittebat febrem. Cum quae hoc ita se  
habeant, videtur plantis mira effluvia debeat exhalare  
ne & sic atmosphaera implere; unde accidit quod in sept  
vix multoties halitus Anacardi praedat; ut accidit tri  
tibus exemplis, in America.

Processus II.

Ab hoc secundo processu dicimus quid Infusum, De  
coctum, Apocema, &c. sint. Infusum enim fit grad. Calor  
211. in vase clauso per speciem immixtae horae retinet  
hoc modo magis facultatem plantae, id est, sp  
ritus illius Rectory. Decoctum fit op. eadem calor  
grad. ac Infusum, sed debet ebullire; si vas aper  
tum manet tunc volat aqua tenuissima, quae post  
in olla Rapinae, vel vase chemico altissimo, ubi  
conservantur quam optime hic vapor, vel sp. Rectory.  
Multae sunt plantae quae decoctionem requirunt subire,  
nam statim inepta redduntur, & vix volatilibus quae sita  
perditur op. ignis. praeter Astringentia, stida, aroma  
tica viscosa, Demulcentia, emollientia, refrigerantia, Me  
tristria, Saponacea, Visca, non debent decoctionem  
subire reliqua. haec dicta Astringentia &c. habent suam  
virtutem in re, quae fixa magis, quam calore 211. vel 212 gr.  
separatur.

Decoctum.

N.B. Vix peculiaris plantae non semper se manifestat suo  
odore vel fragrantia, vel Calfaciente sapore, nam postea  
plantae inelle, quomvis semper vix officiat, ut in radice  
Hellebori nigri, Cula Aquatica Germani, blaro gramineo,  
aliisque.

Decoct. Vires.

Si Decoctio fit in vase sub appposito Alembico, et quae  
exhalans aqua remanenti Decocto videtur, tunc Decoctum  
vix plantae proprium, si non retinet.

Vix Decoctum Infusumne, postquam corpore  
hominis introducta fuit, pendet ab aqua calida, humil  
ac a virtute admixtae plantae. haec regula potest multa  
alia deducere, ut in Plea, aqua calida tepida plus facit,  
quam illa chinensis simplex, detrimenti.

Dicitur quoque ex eodem processu vasa nostra mini  
ma non dissolvuntur Calidis humidis, neque potest quod Rep  
maximus postquam ebullitionem repetitione subiret, solae  
suae integrae possidet. apparent sub finem, pili, apices  
Verruculae, & flos tunc plantae op. microscopis sunt  
eodem. Non destruuntur quia ultima sunt tunc restat  
non saponacea, oleosa, salina. eadem de Corpore humore  
intelligit. Nunc decoctionem plantarum vix aliquot  
et immutatae Anum bulliende mutet. Anum dicitur Apocema  
ebullitione sola fit.

Anum Apocema.

Processus III.

Triplex est modus depurandi decocta, quatuor nempe, Colo, co  
tu cum albumine. Per prior oleum chemia examinis conve-  
nit. Olate enim infusa vel decocta & vaporepando recepta, si  
exhalant ad usum talem mellis, tunc Mustum potest appellari;  
si ad dimidiam decoctum saporem Naturalem referantur diu  
hinc cryptone elibatum potens Sapa vocatur. Defrutum  
quod idem est ad defendendo. Gelatina qd guttulis demissim  
laminis frigida inter glaci remanet. Si Mal d'istius  
tunc Sympus, si spiritus Rob vel Rohob. extracta autem  
vocantur omnia hec parata; que liquida ipsa dicitur nominant.  
Omnia hec possunt dici ex succis proli herbis non fructuum  
horarum imprimis, immo & radicum succulentarum eg gly  
Cyrtis &c.

Mustum  
Sapa.  
Defrutum  
Gelatina  
Sympus  
Rob  
Extracta.

Si ex his dictis volumus habere decocta vel infusa secun-  
dum processum tunc. Diluenda aqua, hec sunt. Hec Sapa dicta  
Mustum &c. Diu servari possunt elibata, vel in anno. Se-  
vant multum planta, quavis in portione volatile amiserint  
ex effectis, & exsiccat plantis nihil potest extrahi, ut propter  
succos non continent. Contra morbos putridos habent Mari-  
cola in hisce remedium quod si cum aqua diluitur mi-  
nus effectus prestat.

Vires, usq.

Processus IV.

Ex hoc processu elicitur; plantis postquam in igne aperto exposte fue-  
runt oleum imprimis dare. Quibus terram Virginiam, muros  
inter hinc aquas bullientem, explantis posse auferre omne  
oleum vel sit volatile vel fixum. oleum tamen ultimum quod  
terram conjungit, connectit, coniungunt.

Udus.

Item dicitur, quod decocta, Apodemata &c, solum de plantis  
sal, & oleum primum, & secundum auferant. nullomodo ulti-  
mus hoc.

Vires medicatas, nutritivas, venenatas, habere in illa plan-  
ta parte, quod decoctione aqua elici potest, dixerimus. nullam  
singularem vim, oleum per se, vel terram in se continere.  
Patet quoque, quod si planta sit caloris celesti exsiccat  
multum de suis viribus perdat.

Notandum est quod planta in genere debet sub analysi  
3. oleum speciat 1. spuma oleosa. 2. pinguis in decocto.  
3. ultimum terram Conglutinans solo igne aperto separandum  
est adhuc, quod verisimile est, primum & secundum ole-  
um unicuique planta, singulare esse, verum ultimum  
omni plantis eodem; & per se patet; nam cum virtus  
medicata in 1. & 2. consistat oleo, debet esse quoque  
singulare liquidum vel oleum; aliter omnes plantae eff-  
dem vires haberiant.

Plantar. oleum spec

Tandem dixerimus sal in ultimo stamine plantis solido  
fuisse quoniam. Eadem possunt intelligi animalibus. Terra  
enim est sola Basis.

Processus V.

Colligitur ex hoc processu Rob, defutem, extractionem  
processus tertii Salis cinerij donari, si igni aperto Cochle-  
ari ferreo Committuntur.  
Immo aquam Bullientem, sal. & oleum plantarum  
soluere. Sal & oleum sunt planta mista in formam sa-  
ponis, inde Naturus plantarum succus saponaceus ex-  
tere intelligitur.

Quinetham dipney Colorem extracti pendere oleum  
at oleo, quod in auray, vi ignis, potest auferri.

Animadvertendum est plantas volatili virtute praeditas  
oculos in lachrymas habere, si igni Cochleari ferreo Com-  
mittuntur, vix restat de cineribus sal, nam valde volatili sunt.  
plantae haec sunt Capa, Cochlearia, Linapi. Rept. Rept. &c.

Processus VI.

Dipitur hoc processu, ubi planta recens comburitur, dant  
ur cineres salios. Salinum quod plantis inest, igne aperto  
non reddit volatile, sed oleum tantum, quod ei adheret.  
Oleum & salum naturaliter mista in plantis, aqua  
passe solvi, unita manere, sed igne separari.  
Sapo Animalium tum, tum plantarum debet esse unitus,  
nam si oleum separatur seorsum, morbus utriusque fit.  
Hipp: hoc observavit dicens: Mista salubria, separata noxia.

Processus VII.

Hinc dicitur qualis sit differentia inter salum illam Proc. VI  
& hanc partium plantarum, qualem ex Aceto & succo elicitur, illi  
fuit productus visibiles ignis, & differt in colore, sapore, figura, omni-  
que effectu tam Physico quam Medico ab hoc secundo. ille  
steorum in planta non praestitit, sed nova creatura, opus ignis,  
ut Helmontius exprimit, facta fuit. varium salum, Diversum  
pro varietate plantae acquiruntur. Becabunga, Cochlearium, Ebulus  
Endivia, fumaria, Gramen, Pasturium aquatium, dant  
salum citius magis similem. + Ex plantis viscosis non acqui-  
ritur sal nisi, spe fermentationis, dissolvatur ille lentior.  
ex Oleosis, & Aromaticis vix potest impetrari hic sal.  
Succus Acetosa si humoribus Acetris inhibeatur, penetra-  
bilis est, & in vasa sal parva penetrat facillime, unde vi-  
rius suae exercere potest.

Processus VIII.

Sal Naturus qui post fermentationem oritur, est illud sal fructu-  
um horarum in hoc Processu rursus adhibentur hinc operi. postquam  
prolixius fuisse fermentant, & arnum impetum dant. si vinum hoc  
longius quiescit manet, oriantur corpuscula, quae ad omne do-  
punctum transferantur. Praecedenti vero processu sal orbale  
in fundo Vasis & lapidis Vini, vel ut Maluere Chemici, granis parva  
vase Tartarum. Acida, Austera & Haec dant plus huius lapidis  
quam Dulcia, & Oleosa Vina. Si non bene fermentant minus  
Tartari huius dant. Sed perfecte fermentationem solum

+ Curant hi succi me-  
dicatis, subintrari, ste-  
res obstructions, ut  
vendo, piceum lento  
nem attrahit quidem  
do. Chronicos morbo  
efficacissime sanando.



+ Et ammonium  
 corrigens laborantibus  
 putrido, acie biliosa.  
 hinc acutis multum  
 prodest. cordilopo-  
 pium aperientem,  
 omnia acedente,  
 postquam se immo-  
 dat cum auri putri-  
 do, non tunc in  
 materiam magis  
 solubilem abit.

tunc multo magis Tartari exhibent. Viri ocrea rubrum, candida  
 album tartarum, creant. Non solvitur aqua, aceto, vino, requi-  
 rit Calorem ebullientis aquae antequam solvatur. Sed ubi haec aqua  
 frigescit statim in massam coit, quae prognice dicitur Cremona, vel  
Crystallus Tartari. Dum Cremona haec Crystallus generat plus aeris  
 elastici, quam ullum Corpus naturae. + plura De haec. Salis inveniunt

Processa 54 & 55.

Process IX.

Arteriae

Arteriarum finis triplex: 1. descendunt in canaly abscisso, qui humor extra utrum exter-  
nam, internam ve exhalant. 2. descendunt in canaly abscisso, qui humor intra qua-  
dam Cava Corporis exhalant, ut in ventriculo Cerebri, thecam. medullary spinalis  
pleuram, pericardii, peritoneum, tunica vaginali, Uterum &c.

3. in vena sanguinea continuata.

Quicquid de his vidend.

Ex libro de meo. Schreiber 17<sup>22</sup>/<sub>18</sub> 92

Tota quanta oriebatur ex arteria mesenterica superiore ad minimum erat aequali arteriae  
splenicæ, quam Bræctor (nunc Magnus Boerhaave) scribit illam esse incredibilem  
vie maiorem.

Opuscula Pathol. Halleri. Lib. IV pag. 13.

Sanguis suffocationibus oroxii, pulve velui: tumor erat albus cuti concolor, auri maxil-  
la inferiore inde clavicula terminatus, in eo duntaxat quidam 8. orile laum. Carotis apparuit  
aneurismatica tunica Craspi facie.

Arteria Epatica

Carotidis.

Ana-  
ma

Ex Dusch. Obi. 38.

Aorta in aorta dā distantiam a corde trium pollicum ingens aneurisma, in quo pul-  
sus aborat, inventum fuit: ita pectoris cavitatem archaverat, ut costarum, & sterni  
ova ad maximam tenuitatem reduceret.  
Ex Her. Medic. Hoff. 8j. Obi. IV.

Arterio-  
a.

Virgo, cui dolor intensus in oculo sinistro obortus fuit, arteriotomiam popae: Cui prius  
intra arteria per longitudinem aperta: Sanguis exit: & suscitatur crebra lapi-  
pis albumine ovi: & ligaturis: hanc Cordulum in ophthalmia operationem Severinus  
descripti medicina: Arabes ut ~~Arterio~~ Phases. Haller & Duret. de morb. intern.  
Cap. 10. & in cataracta incipiente  
H. Roy. Scienc. tom. 2. p. 6

Lapideae  
concretae.

Inventa aorta circa valvulae sigmoides crusta lapidea obducta.

Ulcera  
arteriae  
aortae

Philos. Transact. n° 483. § XIX Haller A.  
Arteria aorta, tum ad cor tum inferius, in abdomine denique, Membrana interna vidua  
lucra, quasi scabendo in eminentes crustas libere, fluctantes, murata, tanquam Ulcere ab-  
quo consumpta esset; Haec squamae parvis ovace erant, abacti petrosae; & auri tophe-  
eorum granorum plerumque vasorum ex aorta oriendorum citra studebant. Membra-  
na musculosa sana fuit, tum externa, ut utrumque omne in intima sedebat &c.  
Idem pag. 523. Demonstrant arteriarum tunicam partem ob repetitis cordis ictibus in-  
dursam, partim inter ossificata spatia rumpi; Sic debilitari tunc Aorta (in hoc cada-  
vere Sanguis aorta erat maximus sed sine aneurismate) tuncum & ad aneurismata reddi  
primum: Demonstrat in ipso sanguine obque terram veram calculeosam circumvoluti, nec  
in renibus solum vii deponi, sed ubi haerere & deponi, congerique ubi rupta sunt  
lucrae membranae vasorum, & attractio terrearum nebularum ad aspera, super-  
fici & singulares maiores est.

Id. n° 492 p. 173. Simili fore historia ab Haller Communicata

Bulla 14 añ ageti capitis gravitate, vertigine, anxietate, moritur: invenitur arteria mag-  
na & vena cava repletae sanguine coagulato, tanquam si gladius e vagina detringeretur  
Petrus Salvi Duret de Syncope & Asphyxia partibus C. IV p. 216

Sanguis  
Coagulatus

Morbi  
aortae

Morbi ou-  
lorum

Syncope  
& mors

Hist. Acad. Scient. ann. 1707. p. 26.

Subitò vir quidam moritur: dum in vivis difficilis respiratio, frequentes cordis pal-  
pitationes, febris lenta, macies, pallor. Inventa arteria pulmonalis interiori  
huius facie tuberculi calculosi, qui parvis ejusdem penetrabat ad externam vasa. Cor solito grandius.  
faciem: aqua praeterea in pectore extra vasa. Cor solito grandius.

Arteria Subclavia.

Aneurysma

Barrere observationes de Cadaver. Peripneumonia. 1751. 4<sup>o</sup>  
Homini tabaci, tabaci anidui Sutor difficilima respiratione frequentior totus: aneurys-  
ma in subclavia, & in aorte quatuor digitos infra anastomum alterum inventum  
fuit aneurysma.

Dum vivebat asthmaticus, facies pallida, tumida, labia plumbea: palpitatio  
ad Cartilaginem xyphoideam: prope mortem inflati pedes.

Arteria Carpi

Dum Nodosa facie

Barrere: Observationes ibidem. 53. Observ. 1. & 2<sup>a</sup>

In Motibus duobus aliis que multum, quibus imponebat Supplicium, vel quibus denega-  
batur demerito ab stipendiis observavit offas induritas que practici de Cum pulum  
horum tangeret, „ Comme si c'etoit une petite corde remplie de noeuds, que  
l'on touchoit, ce qui me fappâ: „ & pagina 61, ait „ je trouvois un pouta rabo-  
teux avec de inegalitez qui resystoient au tact Comme si c'etoit une corde  
ou un petit baton scabreux, que l'on touchoit: „ hi une febre erant taciturn-  
ni, nunquam queruli, jacentes; Cor suum edentes.  
vide sub Cerebro pag. 8.

men-  
affluo



# Venae

*Q*uoniam initium triplex. 1 ex omni cuti externa, interna, ore aperta accipiunt. 2 Ex omni puncto cavi in quo arteria ex halatu exit. 3 ex arteria continua.

Exterius applicata medicamenta, ut intus assumpta operantur: Aloe Calocyntidis purgant, Cantharidis urinam movent; allium planti pedum alligatum expectorat: Cardui apposta roborant: Ergo venae per origina abstergent exteriori admodum tenent intro in sanguinem, ut mefentericae ex intestini ad pectus. Hanvay Exercit. 1. Cap. 16.

Morbi  
vid. Epit.  
morbi p. 28  
& Hydrops

Crueta obdu  
ctissima.

venae  
pulsautes  
ac arteriae

Ita possunt per morbum dilatare ut diametrum trium calamorum scripturarum sequent:  
Ex Acad. Scient. hist. tom. 2. p. 213.  
Resulit chirurgus D. Dodart se in cadavere quodam vasa omnia invenisse crusta obducta in  
terme peritum exitum tantum liquidu circulaturu relinquent.  
Memoire del'Acad. Scienc. tom. V. pag. 159. M. Homborg. M.  
Hyeu decrit une hydropie d'une Dame morte d'un aneurisme du Cœur avec des polypes dans leur  
Cavité; elle avoit des accés asthmatiques; pendant qu'elle il avoit observé un écoulement de venues  
semblable celui des artères, parce que le sang venal ne pouvoit passer le Cœur librement.

Dilatatio.

Altera:  
Cardi in  
pedimenta

Cava  
sterbi

Philosoph. Transactions n<sup>o</sup>. 483. § XIX. Haller A.

Reperi venam cavam in quadragenaria inter renaly sinist<sup>re</sup> originem Venae iliaca<sup>e</sup> vena<sup>e</sup> enor  
miter angustata, ut-ut quidquam transmitteret; aliquid polyposi reperitum vena<sup>e</sup> est; Vena Sper  
matica dextra enormiter dilatata. exinde contra Dat<sup>u</sup> M<sup>u</sup> venarum, angustarum p<sup>er</sup> solio  
% deservitarum.

Tramoci Philosoph. n<sup>o</sup>. 492 p 172.

In femina 40naria vena cava inter renalem sinistram & iliacam vena<sup>e</sup> mira angus-  
tata, polyposi substantia fere obstruata. Vena spermatica dextra mire dilatata  
in medio cadavere: hunc tantum motu

Academicar. Annotationum. lib. VII. Cap. IX. Bern. Albini 4<sup>o</sup> pag. 80

Vena Cava circa iliacam ortum tota concreta reperta est; morbo enectus  
extenuato Corpore; sic concreta erat, ut veluti deleta, cum verteb<sup>is</sup> conjuncta esset  
in unum.

extenua  
to spire

morbi  
v. Cavae

Dilatata  
8.  
Angustata

Tota Concreta

11/ Vena  
Portarum  
in vesicam  
felleam

Ex Instit. Bonon. tom. ii. part. ii. pag. 334

§ In hydropicae feminae cadavere, inflando venam portarum visa fuit haec fng cum  
poro biliaris Communicatio; qua in hoc cadavere amplior & grandior quam in alijs apparuit.  
" Haec poro nubes illa erat in corpore fellea ~~venae~~ cyti vena porta propagans pri-  
mum observaveram, & conspicui magis, quam in alijs subjectis, biliaris pori ramusculi  
cum hi, non sicut ac maiore dictorum vasorum trunci, propter naturam ampliori essent.  
sed liquor injectus vel aer per venam portarum nunquam in cavum vesicae felleae in-  
traverat, sed in substantia ipsius serpentino more divaricabatur & manebat.  
p. 335: & 336. ibid: Illam, ait, communicationem non in vericam felleam sed in porum cyti-  
um. Quod bilem discernendam per illum evacuandam inserviant duntaxat illi qui Cytiidem bily prae-  
stant. Coronidam infestationi imponis se originem bily Cytiacae noscitur.



Morbi

Ven. Loe.

ossea

Lopdy:

Puysch. obs. 70.

Gravida, eodem tempore hydropica, peperit: hydrops mansit; Volaribus circa praecordia  
cincta: mortuus: cadaveris: Peritoneum, multis granis maioribus latulo similibus  
variegatum: Vena Portarum ossea. Epiploon: Consumptum.

Fig. inventi in Vena portarum, hepata Ignatii de Loyola. Quoniam. lib. 37.





de cerebri cortice = Basimatis portio cum annexa portione Substantiae Corticalis cerebri, quam ex merito vasculorum  
= Sanguineorum extremitatibus Contingere humiliter videtur. NB Verisimile est venari quid et  
= iam interesse. 2. Extremitates ultimas sunt notissimae, et 3. videtur Corticem non ex glandu  
= ly Contingere.

de cerebri medulla. Ibi n<sup>o</sup> 149. p. 56  
= Infantis Caput cuius superiore parte cranii ablata cerebrum in conspectum venit. NB Corticis ad-  
= lato, medullaris Substantia se videndum exhibet. Vasa Sanguinea autem sunt numerosissima.

Corvina Viscifera. Ibi n<sup>o</sup> 153. p. 16.  
= Portio Cerebri in liquore servata proutque methodo Vieussiana per 5 horas in oleo fuit decocta, in qua lu-  
= culantissime apparet hoc methodo Librariarum Corticis in totum Statum esse redactam, ut nuntquam  
= septa sit ad demonstrandum: Corticem ex nervi vasculis Sanguinis esse constitutum. // Idem ostendi  
= per numeros leg. 154. 155.

Cerebrum duriss. Ibi n<sup>o</sup> 156. p. 57.  
= Magna portio Cerebri humani lapidei instar adrupchica ante annos 50 indurata atque decoctione  
= nequa saltem tantam adquisivit duritiem, verum etiam lapidei similitudinis instar fulget, ita, ut per 1000  
= annos Conservari possit. // Potuit ne morbi reddere Cerebrum ita, saltem aliqua sui parte?

Pondus Cerebri Ex Inventis. Bononiensi torn. II. pag. 153  
= Cerebrum ovae homini maius, aut ponderosius, si tibi quidam corpori conferatur, quam acrij animan-  
= hominis aequale Cerebrum ovae homini maius, aut ponderosius, si tibi quidam corpori conferatur, quam acrij animan-  
= alij fore. Ibi: Petrus egyptiaci hominis perpendit invenit 14. 6. lb.: ejusdem cerebrum extractum  
= in lancem perpendit lb. 3: 8 $\frac{3}{4}$ : idem fecit in animalibus variis, invenit fere eandem quan-  
= ty minorem proportionem; excepto papere Canario ubi Corpus Brachm. III. Cerebrum gr. 13. ubi  
= proportio vel homini aequali vel maiori. Unde non tutum affirmare homini maius quam  
= alij animalibus cerebrum.

Alibi et  
rebr  
17-16  
5  
vdep. 8.

Primum observatum, alioquin de l'Anatomie de Puffin de la dernière Edition. abr. 1.  
Miles <sup>offa</sup> Sagitta paralyticus formam per <sup>est</sup> temporis, Quamvis, P. qua mater uteratur. 7.º Sopor,  
Pus fœtidum larga copia & excrecentia multa pubescentibus singulis diebus per foramina fori-  
trapano repetito: foramen Sagittae in profundum cerebri descendit, neque adfert perit:  
tunc Paralyticus lateris oppositi dimidii corporis: morbo melius procedente primum  
cui paralyticum moveri incipit, & postremo brachium.

Quando fore 4.º cerebri consumpta fuit per suppurationes, & excrecentias abscessus, for-  
no inui latente, Suppuratio melior apparuit: tunc terribilis Convulsio.

Siccum redditum fuit corpus, avertabatur omne ciborum genus praeter lac  
Nulla febris tempore suppurationis supervenit, facile pus exibat per patentissimam  
foramina tria trapano facta: neque febris fuit nisi subito mox celeriter sanguine.

Nullum delirium, neque phrenitis; unde illo sensu communi seu Origine non  
vixit, nulle mentis erroris ideae: unde Cerebro nulla idearum origo.

Unde apparet primo vertiginem, soporem, paralyticum, convulsiones, ~~Paralyticum~~ esse  
motuum cerebri gradus hic: ut observavit Meschery tr. de Apoplexia Convulsiones non  
fuerunt in cane vivente nisi adacto ferro ad corpus callosum ut hic apparuit, quia fuit  
duo vicinis Cerebri erat per mundum, ideo foramen altius Cerebrum, seu Corpus callosum  
tingebat: unde etiam pia mater nulla Convulsiones, sed tantum torisionem, ut ~~Philly~~  
de ~~Cerebro~~ in dura observavit matre canis viventi. Philopole Bonaparte.

Omnes mentis erroris ideae fieri erroris possunt illo Cerebro, & hoc lesio, illa erroris  
fieri possunt: Arterii & mater, & dura, quae nervi omnes in origine sua circumdant  
inflammari & vel alij lesi causis possunt erroris ideae fieri. ut invenit multij huj  
ficientibus, ventriculum afficientibus

Tulp. lib. 1. Cap. 27. vide pag. 22. in Polypo cordis —

Ex H. Ac. 1703. M. pag. 261.

In Bore pingui dano, notissimo Cerebrum marmoris simile inventum fuit: aliquot ejus partes  
infans, spina medullaris, nervi inventae fuisse multis naturalibus similes. Bartholin. Cent. VI  
observ. 31 refert similem casum, ubi macer, pendulum caput, aeger 20. erat. Hinc in  
bi non sunt penitus ob partium solidiorum mutationem, sed ob liquorum naturam mutatum

Idem 1704 M. pag. 6.

Puella 5 annorum nata lenta febre, ad motus impotentia, tanquam si catarrho lebanesset de-  
stinabatur: pilulis variis, intermissionibus, ceter, aliquando lentus, respiratio facilis, catarrhus gra-  
vis, Somnus placidus: Sodus ante mortem per 15 dies malis inore, pulsus frequens, durus,  
vires emphysema a bucca dextra ad per totum Corpus longum sequebatur, praeter inferiorem  
arum, inflatio ad tactum celebrat: crepitabat sub digiti cutis. mortua.

Cadavere: Sanguis in dura, pia matre paucis; in ventriculis multus Serosus laevis:  
Integumentis venter Scirry Cadaverum odor aequalis: (an ex aere) Epiploon sicut in  
aestivis valde minutum: pariter fore exhaustum: menterii glandula durae, alba  
tomatice: pulmones tuberculis clatebant adherenti pleurae, tumor, apparuit ad  
Cordis basin Insuper arteria pulmonali, nuci formis, Scirrhosis: ejus radij  
vasa sanguinea penetrabant Val Spinam dorii desinebant.

Haec tumor puto causam hujusmodi fuisse:

vide fol. 8.º

Ex Boner & Anas. p. 122. lib. 8.º. abr. 7.º Ex Nicol. Vannan. Refert se pu-  
ram salivam, florem colligentem, pulvis parvo frequenti, lingua nigra, nigris excrementis pilularum  
forma, dentium invenit: Morbus: In Cadavere, in Corpore calloso invenitur tumor nuci ju-  
glandi similis, arterij rubris distinctis: aperitur abscessus apparet.

Ballonius Epid. 1. pag. 3. de puella febre intermitteni, sine alij admixta, carij, Convulsiones  
mors, Cerebrum humidum solito plus in cadavere invenitur.

vid. pag. 83.

Paralyticus  
Convulsio  
neviden-  
ta  
atrophia  
Febris  
nulla  
Nullum  
delirium

Apoplexia  
aqua, pituita

Emphysem  
putred  
epiploon  
putridum  
tumor  
arteriae  
pulmonal  
milde

Athenitis  
aestiva

Capiti dolo  
res, convul-  
siones

Petification

Hydroce-  
phalus

Abcessus

Serum



Morbi  
asp. ast.

Julij lib. 2<sup>o</sup> Cap. VII

Spiritu diff. Cuius Amundiamen per 7 annos difficili spiritui, Tussis toquebarur: infirmitas corporis, macie: Accidit  
ut Uthmentes tussiret, & tuare putamen apicaret, quo spatio curaty: indicabat ager locum dolentem,  
Solbat Caput appone artemia. Hechs-tetony 161. Decad. VI. Lib. X de nummo ibi detento.

vicus pe Mem. de l'Acad. de chir. Pierre tom. p. 347

netras

48

aputa  
mine ibi

Lug vene  
rea.

[illegible]



Morti

4621

Morti

21.  
C 4415

Mab:  
Cuis.

12.

Coeur blessé  
vivant  
vulnus cordis  
Cura, sanata.

Un homme qui ayant le cœur percé d'un long d'épée a vécu encore 24 h<sup>es</sup> après  
Ludwigsburg. 1704. 4<sup>o</sup>

Joh. Wolff steno. chirurg. medic. steno. XXI. p. 70. Quodlibet punctum  
Reperi Anatomice Torrey se profertur cadaver juvenis, qui ante 4<sup>ta</sup> annos punc-  
tum impetore laesum, & curatum, apertum, Cor tunc de industria lustrare, & apparuisse  
Cunam Cordis vulneratum; Creatrix restitit omnibus facile in pueris.

Foramen ovale. Vetus  
acc. Philop.  
N<sup>o</sup> 454. p.  
166.

Vetula 80 annos nata corde foramen ovale apertum invenit fuit; Causa ibi affligit  
natura, & haec naver enjoy's a moment's health in her life. Ibi de puella qua  
sub aqua per 15 minuta ut auit, Revixit sana, quomodo de causa mortua per 5 die:  
informa erat: Deo cunctis illi, qui facta valentissime vivunt a teneris foramen  
ovale esse apertum avertit, & Deo inco lumen sub aqua vivere!

Morbi  
cordis

*Polypty*

July 1.1 c-27

Hæc Tremidus, hæbe repente cecidit a motu antonio: in Cadavere inventa: Cerebrum flaccidum.  
 Membrana multa pituita perfusa; venæ eadem materia turgebant, sine falisiformi: Stantia: *Apoplexia*  
 copia ut exstahi possit omnes longius filii. Ventrículo aquæ plurimum: in spinalique medul-  
 la etiam, tanta copia ut spangia succat opus esset, ut luminaretur partu: in *Corde* Simili  
 polygam exalta ac cinerea pituita inclusa membranae involuta: ederebat cornu cordi  
 fimo: annexabat. ligula trunca, arteriam aortam, & arteriam pulmonalem obstruere: valvula  
 claudere non poterant.

bulny

Exhib. Ac. Scient p. 279  
Cusdam cor gladio trajectus adhuc per 24 horas supervixit.

*Auricula dilatata* Idem. pag. 337. N. 338.

Alidam pag. 337. N. 338.  
 Auricula dextra cordis Praefecti navis ita dilatata inventa fuit ut infantis caput sequeretur :  
 librum cum semisse sanguinis continebat : interius auriculae pariet. Substantia onca Mary res pueri  
 Composita obducatat : idco dura apparuit tonda, tamque pila aere plena : Mi res pulvis  
 piratio difficilis, durus & frequens pulsus erat, Cordis palpitaciones : ardui mor palpitatio  
 exanderantia summa, qui singulis augebatur diebus.

Tumor vide fol. 12. b. sub Hydrocephalo.

Tumor ventr.  
 Pulvis cordis Dr. Schloph. Transact. No. 464 p. 123.

*Polypi cordis* Drs. Shulph. Transact. No. 464 p. 123.  
 albi ad vena Ex frigore aquilonari, ex potu spiritibus, ex frequenti mutatione calidi & frigidi.  
 Karteria mag Ex oritur polypi veri.  
 ex corde excen-  
 ter. — — — — —  
 cordis languinis veri & languinis exstant, quae in pericardio collecta mortis causa

Experiencia Cordis sanguinis veri & sanguinis  
fuerunt: vide Pericardium. (long. 10. 11.)

Aqua  
 Et Radones spiritus  
 Difficultas spirandi, per annos 30, de appreciatione hominis.  
 natabat: libras aliquot putres Quarta: in lotus dextrum facili deubility, in lony super, naly  
 Cam Syncope: aruerant pulmoney, pulvey magny, elaty, tardy, intercusy; Sany sub  
 de transione interit.

*Coloribus, & Expressione. invariatis.*  
*Ex Nic. Fontano Resp. & Consulto. Med. p. 59.*  
*Paralytica sine manifesta causa subito moritur: Cadavera Cor duplo magis.*  
*Ex aqua & sanguine atro grumoso Paralyticis*

Ex Nic. Fontano Resp. & Consult. Med. p. 59.  
 Aet. 17. ann. nat. Paralytica sine manifesta causa subito moritur. Cadavere Cor duplo nat.  
 manus solito, articulae maximae Venae atriisque aqua li sanguine atro grumoso Paralytic  
 admodum dilatatae; dicunt hanc thoracis hydrope laborasse.  
 Nunquam animi deliquit, cord. palpitatione, neque moestitia, suppuris, dolore  
 dum vixerat tentata fuit.  
 Inter arterias, aqua vir gemitu.

abscisus. Hist. pag. 60.  
Tum. pur. mox, gemebundus moritur. Cordis cavi sanguis ater grumulosus, aqua viridissima.  
pericardio: abscisus intus vni prope sinistram Cordis auriculam.  
tubercula plura, tumores, vermes, calculi, crines, callosi. veda Ula-  
de Med. Hsp.

pericardio: abicefuy inilor oim pape  
In corde abicefuy, tubercula, olea, tumore, verme, calculi, Cring, calky. vede Ucla-  
lum. lib. 1. de fabric. C 5. Hall. de morb. lib. 1. Marcel. Donat. lib. V de Med. Nys.

Polypus

lun. hb. 1. de ponce.  
Cap. 4<sup>o</sup>  
Diver. observ. 88 Cent. 1. Juvenis 5 an. nat. cum curvare difficili corripiebatur respiratione asthma  
tione, multo tandem in tuffin, febrem parvam, alii fluxum modicum in quo flava visiva. pulsus  
5.° lypothymia corripit mortitur. Cadaver. Grey fellea gravior humore ni-  
gricante repleta: pulmo larynx diaphragmati haerebat: Sinistra Cordis auricu-  
la solito amplior, repleta materia crassa, compacta, alba, laevem coctum referente.  
S-lava sieminitati pulsus in-

Ulcus  
cum pericardio  
adhaerente

Dixer. obser. 87. Ann. 1.  
 Puella 14 ann. comitit pueritiae, Cardialgia elongali debuy mane; dolore sanmitatis  
 10 scapulae; alvi fluxus: Pulvis intermittere Epidur; decubitus in sinistram latu  
 difficilis, qui si tentaretur cardialgia ilico. Lumbi corripicatur: huius sic erat:  
 flatu inferne & superne: Sonitus paucus; difficultas sporandi. febris intensa. Ne  
 34 sputo sanguinis liberali: quo continuato per biduum innotuit.  
 Invenitum vlay Cordy: apud Schenckium simili invenitur.  
 vide fol. 76

23  
Cerebellum

Experimenta D. Abt. Kautz 9. Julii. 1742 Itaq. Comiti data

Acu intra Cerebellum adacta fractus magnorum virosum auctoritate expectabam fulmine  
= quasi ictum cadere animal; cum non modo mire convulsus superstit, sed usque nunquam in uno  
= experimento requiescit, perferre hunc quadrantem supervixisse vidi, currens, currens, latus, imo  
= vixit, vixit, denique, quæ cum inopinata acciderent, ne fidem negarent illi, apud quos potius  
= opinio præjudicat, quam imitatio rei discernis, demonstravi hæc experimenta, plurimæ  
= D. Chirur. g.

Morbi.  
Cerebelli

Bribeau-observatory. la 3me

Timpanistika 40 annos natus in vehementissimos dolores totius Capitis incidit, ad quos  
levandos nullis remediis potens fuit Medici: tandem miserrime Cruribus mari-  
tibus tur. Cadavere: tumor leucosty, qui scalpellam resistebat, intra Cerebelli cor-  
tumot: pus inventum fuit: arteriae intra cranium per uno sanguine erant parum capiti.  
impletae.  
vide fol. 8. in fungus

Mollo, de  
durum

Ex Boneti Sep. Anat. tom. 1. p. 49. ex Nicolae Anthropol. lib. 6. c. 2.  
Iis, qui aridius capitis dolore in occipitis laborant, observavit ille Cerebellum esse  
Cerebro mollius; malis aridum & friabile.  
Henricus ab Heers observ. 4. Spadaeren. Dr. Cuius Leodienis: ex melancholia furio-  
sa reddito Cerebrum illi sicumum, durum, flavidum tinctum.

dolores  
occipitis

dolor frontis

Adversus

Medical Essay vol. V. P. ii. art. 53.  
Gravitate, dolore frontis asiduo, caput antrosum ad genua inclinatam, evacuationes multa-  
magna, omnes frustra: pulsus bonus, nulla convulsiones; appetitus prostratus: ante mor-  
tem dolores avarunt, appetitus revertetur; sed post 24 fore repente moritur.  
Vires duntaxat puri in tumore suppurato intra abellum, & sinistra laterali Dura M.  
Sanguis coagulatus, inventa in cadavere fuere.

Scintilla

Ex Philo. Transact. 1774.  
Glaber. Haller puerum, qui omnem victum querebat, VI anno natam Diuicem cui Scintilla in  
cerebello invenit, & inutile ad functionem, quae tamen fiebat, utaq; reddebatur: unde Cor non tanta  
quantum creditur vulgo necessitatem habet ut cerebello sano utatur: vulnus cerebri illud non  
interficiunt. vide Casum simil. Act. Parisien. ann. 1705. n. 13. vid. Opuscula Pa-  
thologica Halleri. Lausanae. 8. 2<sup>to</sup> ab Anteriora Lethorum in cerebro, glandulae Morosissimi,  
Inguinalium, & bronchialium. pag. 11.

24/  
Capit



Merbi  
guibay ten  
tupay Capi  
dy porsey  
anad. inu.

50

Diaphragma

Descripsimus de Balfon primum, quem sciam, Cogitavit diaphragma esse organum sensiti-  
vi sensus, seu illius officij doloris, & tactus; sed eas enim sunt in grano, v.g. tritici adex-  
im medio epij punctum, tanquam fulcrum, ex quo procedunt & rami, & nervi, & folia sui  
suntum ita puto in corpore fieri cum diaphragmate, quod est fulcrum totius fabricae  
animalis: non solum ut regat per motum alimentarem vires in abdomen, sed etiam  
motus voluntarios: nam si homo concipiat rem ingratam, vel gratam, illius rei sen-  
sum sentit ad scribitulum cordis, sed quod illius sensus tantum in diaphragmate est:  
sensu hoc grato vel ingrato simul ab homine percepto, determinatur tunc per motum  
voluntarium, vel cohibentem, ut rem ita perceptam prosequatur, vel aufugiat.

Cum tam potelle videretur rem ita manifestam, considerationeque pulchram,  
Cogitavi ut nervorum propagines octavi parii, quae oesophagum praeseptam, inveni-  
rentur dissecantur, nunc earum aliquod ad diaphragma protenderetur ad illam  
locum ubi oesophagum illam perforat: annuit Illustri viri, & Cadaveris Compa-  
rato, saguentia observata hac die fuerunt praesente Celebrissimo Anatomico  
D. Ferrein.

Ita enim omnibus notum octavum par nervorum bifurcam duarum utrinque oesophagum decur-  
re inter se subter pleuram; simul ac pervenit ramus singulis oesophagi ad illam partem ubi oeso-  
phagus diaphragma perforat, ille octavi parii ramus in varios alios abis, & nervulum tanquam  
circa diaphragma, quo oesophagum complectitur: quando ita parum pervenit tunc illi rami,  
decurrunt inter pleuram et pericardium, & per hoc decurrunt, & illi rami jam minores, quod  
in diaphragma se expandunt, ea in parte illis, ut pericardium jam adnexum diaphragmati  
non est.

Simul ac oesophagus perforat diaphragma ad sinistram in parte myculosa rami  
6<sup>i</sup> parii, qui venticulum amplexantur ibi tendunt versus libum foraminis diaphragma-  
tis. Sed hic querendum & sciendum ubi tendunt pars diaphragmatis, & ubi my-  
culosa epus pars.

Tunc querenda illae partes quae sub cartilagine Xiphoidae sunt: haec cog-  
novandae si stilo adacto ad extremum cartilaginis Xiphoidae: stily puer responde-  
re non poterit venticuli ori superioris, sed centro nervo diaphragmatis: sed vide-  
bimus.

Morti  
 Diaphragmati  
 Effusus  
 Transiens  
 Bonet. 1 Br. fol. 157. lib. 1 § 7. lib. 1.  
 Refert puerum ex hypothermia mortuum subito fuisse. In diaphragmate abscisso in Lepidopteria  
 Cym cum vesicula appensa tantum invenitur.  
 Non foramen in diaphragmate fuisse ab puy ex pleuritis oritur factum.

foramen  
 Eius spatio Gotschy Clauderi ad Marum Ruych Med. Amstelod. Batavi. 1661 dat. In qua vomitus ad  
 Historia Juvenci post committationem denari per ingens horridum vomitus Natio Josephus gradierii mortem  
 mors, piceae intra tres dies. Cadaver invenitur foramen a natura factum in diaphragma-  
 te, sine ruptura, per quod ventriculus cum parte coli intestini in cavum pectoris penetrave-  
 rat: Cor in dextrum latu detrusum ut ventriculo & intestino locum daret. dum sanus  
 erat illis post partum asthmatic corripiebatur: ad caesam sanus.

idem  
 Philosophical Transactions n° 478 art. 3.  
 Puella moritur: invenitur foramen in diaphragmate per quod ventriculus, pars illi  
 intestini, Caecum cum appendice, coli portio in pectus intraverat. vide locum.

Osseum  
 Le 14 9bre 1797. Le nommé Basil age de 53 ans entra at. Hospital St. Ety de Mont-  
 pellier: ... il avoit le pouls faible & intermittent, un deliré considerable, les yeux  
 caves basés, les dents & les gencives noires; la Respiration facile: C'estoit à 5me  
 jour de son mal sans que on lui rice fait encor: ... Il survint un Meteo-  
 risme & la malade mourut le 8. de la maladie: On porta son cadavre dans  
 l'amphitheatre apuy l'avoir ouvert On reconnut, que tout le centre du diaphrag-  
 me étoit oulé de même que une partie du pericarde qui s'y avoient: la piece  
 offree avoit plus d'une ligne d'épaisseur: M. Vigaroux Maître chi-  
 rurgien de cette ville garde la piece. // M. L. D. Layan m'a communiqué une  
 Observation, qui lui a été communiquée de Montpellier. 1798. 50.

Deliri-  
 um  
 asiduum.

Ex percussione Fred. Hoffmanni tom V. Medicin. Rational. pag. 324. cap. de Asthma Convulsivo.  
 Scabulicordis Refert, Ex gravi scabulicordis percussione subito hominem peripneumonia suffocatum:  
 Est mortem Vitium fuit, tondineae partij diaphragmatis, Jugg. Natio & Similia  
 sequente a percussione factae.

Moss

Adhaerens  
 Pulmoni.  
 vide pulmo  
 pag 51  
 Tumores  
 Sunt tumores relict post inflammationem: vident orthopneici & asthmatici mortuum  
 vide signa in Libro Salis Divino Cap. VIII de Effect. partium.



Morbi Brisseau observation. 2<sup>a</sup>

Suppuratio mor post 18 menses ad connexionem suturae sagitalis cum lambdoidali ap-  
dur. mat. dem Dura mater suppurata, scilicet emissit, sicut tendens suppurati; post  
Cranii longas abundantes suppurationes, Calli inducuntur sunt omnibus Cranii, & dura  
tunc tandem eger: nulla huiusmodi venere suppuratio aderat

ossea Ex Hist. Acad. Sc. tom. 2. p. 25

Inventa Dura Mater ossea: homo ~~nonnullus~~ dum vivens stolidus erat ad mortem.

Falsae oculi Ex Hist. Acad. Sc. ann. 1711. pag. 27.

In Juvene praeci 3 annorum. 1<sup>o</sup> febre valida, memoria defecit, post aliquot annos Epilepsia  
epilepticus factus; insulsi menstruation, tandem frequentioribus. anno 27. moris.





Hildani Sns de Omen  
ti 1704

Refertur in illa Cavitate omenti deponi duplici aërem, (quodamque humorem, ita ut massupium illud fuisse  
aëre humore repletum; deinde ibi flatu contineri, hanc murrina omenti, quæ hypochondriaci omentum  
prosectione in aperto latere, ubi cavity illa magis propatula est: verum membrana illa omentum  
fœmininule perire flatu non continet; Cœpta quamvis fieri ob morbo, sed flatu si fuerint a  
puretione hanc. Rerum prope, quod in hypochondriaci in longi annos prolongatur. Ideo intra intes-  
tina, proprium Colon.



Hydrops.

Mulier per 15 annos hydropis laborans mortua. ~~facta~~ in cadavere  
Vasa Sanguinea per totum ventrem diametrum trium digitorum semper  
aequant. Epiploon cornutum redditum; crassitie digiti, peritoneo connatu  
in medio ventris tumor pugno aequali; in eius medio pili similes illi capiti  
inversi fuisse, digiti longitudine & microscopio lutati radice carebant.  
Epiploon Scurvorum. vide. Pulmo. St. b. observ. aer in Hydropis

Carnem.  
pili viti.  
Scurvus  
tumor

In Puerperio  
Kultra

Ruych. obr. 63.  
In mense foeminae post gestationis tempus mortua tumor molli inventus: Sanas  
hunc post gestationem proly sine magno incommodo ferunt, & apprehendere mani  
bus tamquam fascimen possunt.

et optime naturam omenti contemplari ait, Quando abdomen elevatur  
omentum arctatur, in minus reducitur spatium, tunc inflammatur, peritoneo adha  
ret: ob dorem partu protelatus idcirco fieri posse.

Scirrhus

Ex Bonis. J. An. lib. 1. § IX p. 239. ex River. Prae lib. 13 cap. 15

Melancholia

glandula foeda  
materie referri

Her. Meibomius de Gland. Inter. natur. fol 58. Edidit. L. D. 1718. 4°  
Vidi aliquot, qui Struma, & Scrophula in collo habebant sacro omento desissa phorbis  
glandula foeda materia referri: ... posse mutari glandularum, musculorum: Georgius Horstius  
in Editione Amstelredam. Donatum, infemina, aq. omentum tunefacum abscissum ad  
56 libras pendens

Scrophula

Maximum  
omentum

Ex Philosoph. Transact. n° 382. tom. 7. abridg. part. 3. pag. 518

Vomitus bi-  
ly atra  
dolor Scip-  
tro hypoch-  
on mory

Scirrhus  
rubrum, contrac-  
tum

libr. XVI 1/2 pendens: lapides nigri in vesica felle.  
River observ. 48: cent. ii.  
Canonicus incidit in omentum Contumacissimum, qui nulli remedi  
cessit: erat temperamento melancholicus adustus & tanquam melancholicus morbo of  
fessus affligebatur a medicis: sed fallebantur. Cadavere  
Omentum crassum, rubrum, Scirrhus, contractum, ut hep. prona fronte  
refferet: Ventricle latus, superiore ejus parte Scirrhus: intestina livida; lier  
anus.

Linguisimum, in-  
rum, hydratibz

Herster observ. 382. p. 445  
Crassius trium erat potius. omnia abdominis Cordonia circumvolubant: Integ.  
tunica Coecum cum appendice magna erat praeputiosa durissima perforata, per  
quod confusus contenta praeterlabantur. inventa Secus cadavere, aq. mory  
ferum: Dns debacchatione Vtrum quid potum ex Vno Hungarico &  
atq. in diarrhoeam implacabilem incidit, & phlegm. mortuus, Consumptus  
et exhaustus.



Monti  
Glandula Dorsalis  
ad Oesophagum  
sit, vel sitae.

Hentor. Observ. 467. pag. 534. Div. Angli.

Hi refert in multis cadaveribus. hae glandulae nullae inveniuntur; aliquando videntur, aliquando duas, ut Vesalia observavit: Pusillus invenitur aliquando ut humidus fuerit totum omniurum perungit interceptant. non loquuntur de causa per caliditatem, ut si bene recordemur, auduisse auctoritate acriditae Pusillus hunc morbum curant.

Profrator Parisi I Nicolay Bidlo mihi retulit simulam. Le apronum tractate, antequam curvy dyssipatas deglutire inceperat: apertis cadaver invenit cancerosam glandulam Oesophagi maximam intabum commensam.

Stroma

Steller Opuscul. Pathologicae. Lib. VI. p. 16.

Epitheloides glandulae degeneratio

In portuientibus aer per conatus admittit: vid. Mem. D'Esch. p. 153 de leg. ad calcem. portuientium sed invenitur molli cornea, alba callona pinguedo in medio & aliquid lipidum: ibi malorum. multa similes hydrops, ubi Hydatides, Cytica, Scirrhus, arena tophacea. p. 17. Idem. Lenticulorum fieri possunt morbus Compositi veni & arteriis. circumjacentibus. vid. p. 18.

Hepar

Ibi Vermes inveniuntur in hepate arctij: ibi causa indicatur; quando hoc pecudij ge-  
nus pascitur herba Sideritis & labra arvensis, tunc vermes generantur, sicut les-  
folij hujus herbe: ibi refellitur Ant. Canet. Gemma & aliorum qui ex his vermibus  
in animalium hepate inveniuntur conjuunt fore ut perij inter homines graficetur.  
Cum frequenter sine peste inveniuntur illi vermes in hepate illorum animalium.

abcessus

Invenio dolore epigastrii, febre tumore dextri lateris; Cauterio potenti 12  
scalpello apertus tumor, pus exit, sanatus. Merchet. Simily refert. Obs. 52.

Hydatides

vide Vteri morbos. pag. 61.  
Ita observ. 65: ubi totum hepar in hydatidibus abest.

Hydrops

Ex Hist. Readem. Scientiar. ann 1761. pag. 147.

Successerat letargia, totius corporis macies, hydropica tunc mulier facta: Inventa vesica fel-  
lis distenta ut aliud simularet hepar: continebat multifariam hydatidum, pelly quae, ex hyda-  
tidibus ortas, quae per abscissum dum inveniit exitum: hepar erat siccum & valde tenue. In anima  
hic morbus in amenis valde rarius est, praesertim viris, & viris, quibus perquam libe-  
augmentum nutant maximum attigerunt, & pinguedine abundavit hic superavit  
morbus, macies, in ventre aquae inveniuntur. Cognovimus hic morbus in viris, quibus quam  
do glandula lachrymalis minoris anguli oculi comprimitur, & glandula lachrymalis signum  
rubedo non apparet, tunc hepar hoc laborat morbo.

Alnus hepatis,  
Vesicae felleae rem

Philosophic. Transact. 449 § VIII  
Robustus vir febre intermittente laborans: Cautio periculis imprudenter Febr. Int.

Icterus

Curata febris; per aliquot dies 14 annos postquam hepatis & lumborum acuta-  
bat, quae incommoda per purgantia evanescebant: Tunc & ante mor-  
mones Ictericus factus, dextro latere dolore lancinanti, inflammatio, pus  
apertum apertum fuit; & multae puris non boni mactur Captae  
fuerunt intra 25 dies: tunc frigore pressus moritur cadavere

Inventa fuit cystis fellea nimium distenta, & sacculi, qui tegumenta  
elevaverat, Calculi, cretacea materia plenus: reliqua minoris momenti  
vide locum.

Ex Bonet. J. Anatom. lib. 1. § 3 p. 234 obs. 32

Nobilis quidam ad rerum suarum pacem gravi animi dolore & agitudine of-  
fusus tristis, agnoscendus, lenis, timor, commissus monachis, foras ut exorismata  
agerent, contraxit eorum diu fuit: tandem debilis, sine febre, viri: Urina rubra  
que non turbida virgineam: fastidium ingor, parum libor, adspers. marie  
confectus moritur.

Cadavere Hepar tantum invenitur nigri quam anatura: Pulmones

Pulmo

Substantia magis nigrescat, & foreas digitis impressis retinebat.

Aqua

Philosophic. Transact. n. 475. an. XVII. pag. 305

Femina 40 ann. nata acuto dolore assiduo in regione hepatis, tantum tumebat, & hydropem  
pessus inflata undulato profunda sentiebatur elubri tegumentis. moritur  
pessus inventum hepar ingentis magnitudinis: adhaerebat partem peritonaei  
vix inflammatione; in largum ut vesicululum sed non pertingebat, comprima-  
bat nephros, & pectoris cavitatem arcuabat: majore loco hepatis apert  
oculo lutea aqua limpida effluens ex maris fuit ex hinc hepatis: Cui  
ex glandula Conglobata, quae in aqua sed morbi: hepar fuit in aqua lutea  
quanti ut morbois erat: nulla viri agrote; neque in vena magna muta-  
tio: facere non poterat tantum supra pectus. hydropem pectoris simulabat.

Cancer

Rever. observ. 53. Cent. ii.

Bravo epigastrio lateris dextri, dolore, humerum dexterum doloribus infestabatur, ut  
placitum multarentur: tantum in opio indoluit dolor. dolor praeterea  
in Coxa: vide locum: ante mortem hydropica facta  
cadavere, hepar tumoribus scirrhoris, parte sui maxima suppuratis;  
in Cuius extremo duo tumores cancrii pendentes, ad umbilicum virgula: hepar  
pendebat # 20 Lamplij: diagnosi hic fallax: nam appendix illa can-  
crose inventre faciebant, & ab hepate ortum ducebant.

Ex Philop. Transact. N. 422.

Intestina extra  
ventrem pendula

M<sup>r</sup> Claude Amyand vidit puellam recens natam cui Intestina  
pendula erant: foramen circa umbilicam dimid. pollicis diam. vixit tan-  
dem triduo: Simily observationes vid. Ephem. Natur. Cur. Dec. I.  
ann. VI. & VII. ob. 232. p. 341. & Deur. Clemda Ann VI. ob. 126.

Ex Inscr. Bonon. tom. II. part. I. pag. 138

& Intestinum Duodenum, ab initio procedit cum mesocolo conjunctum, ac de-  
super descendit, colo arcuissime, laevy vni dextro, adherens. tum colon, ac re-  
dignis descendit, colo arcuissime, supra spinam inflectitur; adhuc mesocolo adherens. Me-  
stem quum relinquens, supra spinam inflectitur, inter subjectam venam cavam  
quod etiam doctissimus Santorini animadvertit, inter subjectam venam cavam  
superpositam venam portae se immittit, sed sinistram ventris partem adcon-  
dit; nec unquam mesocolo adnexum est: donec ad ~~mesenterium~~ meserae  
um perveniens superiori eius alae tandem adjungitur; Namquam me-  
stem duodeno leviter dux adherat hoc loco, m<sup>o</sup> in tamen mesocoli  
partem, quam modo duximus cum duodeno conjungi, radicibus suis pervadit, &  
suum antevy fertur: Oportet ergo intestinum duodenum mesocolo curam  
dari, atque ipsum quasi perforare, & circa medium volvi.

& tota via estant, qui docent tenuia intestina omnia mesocolo ad-  
necti, eoque quasi sustineri: Illud etiam accedit Int. Duod. & dyces. Ad ad-  
Colon adungi, Vni dextro supernumerare, & praeter posteriorem mesocoli  
partem excurrere, tum ad anteriorem quodam partem adscendere, quorum  
nihil antea ab anatomicis scriptum fuerat.

In praxi possunt renum symptomata oriri a duodeno, & symptoma-  
ta duodeni aene dextro, colon etiam intestinum ab utroque: Sunt etiam  
meserae glandula in morty indurata & tumenta, ha duodenum compriment  
hinc vomitus: potest duodenum Capisy reddi, tunc meserae vasa compri-  
met; venam cavam subjectam; portarum superpositam: vide Santor-  
ni observationes Anatomica.

vide Medical Essays vol. IV. fol. 65. & Sep. Vid. etiam Santorini observ. Anat.  
Cap IX § 7 p. 167 ed. 11. Syda. 9.º de duodeno, morty qua ibi nates.

De Sim

Intestina Contracta in hydropa, vel ob compressionem aquarum, vel ob inediam.  
vid. §1. b. in hydropa

Coarctata

Intestina omnia Coarctata peristalticorum motus ablati: intestina fecer-  
buz plena; muci olei defectus. vid. Cooper Anat. tab. 34 explic.

motus  
peristalti-  
cus ablati

Ex Ann. Bononiens. tom. II. part. I. pag. 157

glandulae ser-  
reosae duode-  
ni

Mulier diuicino Vomitu cum laboraret cum cibi, tum puri, interitit. Menses summa;  
latus ut in Intestinis flavebat: omnes vires aliquod supererat: aerophagii passio longior;  
quem ventriculus sequebatur, ad regionem vixque pectus, & hypogastrium occuparet totum: Ophi-  
cum stomachi inferius depressum, cum ventriculi prolapsu; multo quae his magis tumor in-  
iens, qui ad initium duodeni excreverat ex illis glandulis, quae ibi frequentius esse solent,  
aucta, astrictam ubique Sartheam, aliquibus in locis oricam obstruebant. Erant autem in  
glutinate, compactae quae ut omnem aditum a stomacho in intestina intercluderent.

Vomitus  
aeris  
serosus

Tellus vesicula macram in modum distenta, tili plenisima, magnopere flaventis: la-  
poris quoque interiorum, scilicet, ilei, flavi quasi puncti distincta per totum nullo mor-  
ne: Vasa praeterea haud paucis apparabant colore flavo, quae ex intestinis erumpentia  
ad mesenterii lantum procedebant, sua adpectu primo, postquam aperta, laetitia esse  
ostendebant & bile plena; nam humorem gerebant qui plane similem, qui in tili ve-  
sicula fuerat adinventus, ut dubitare non possit.

& H. A. Mehnke p. 158 probare conatur bilem secretam posse per vasa laetia provenire in  
mesenteria, denique in sanguinem remeare: Novum in veram causam: Puto fere posse  
rum: si vasorum bilem secretum obstructione: cui assentior: Sed ad primum puto, bi-  
lem quae in vasa vasa quae mesenteria fuisse inventam ibi fuisse formatam & illam a u-  
sua tili omni non differre: multa hoc docent observationes in morbo capta.

Sanguis  
Dumor

De re. Observationes tres de Cadaveri. Peripneumoniae. pag. 48. 49. Obv. 1. & 1.

Vomitus  
aeris

Ex his duobus Observationibus Constat quidam Vomitus hunc morbum comitari: inven-  
ty tumor in vasa ex exteriori parte duodeni: qui tumor dum vibrabat igitur  
explorari poterat duobus supra umbilicum digitis versus dextrum latus

Juvenis inter 18 & 20<sup>m</sup> annum natum doloribus colici, ventriculi quae praeteritum circa ven-  
tricum laborare cepit: nulla remedia mihi nota Neque lavandi, neque sanandi dolo-  
ribus profuerunt: 18<sup>ma</sup> ad 21<sup>ma</sup> dum in puri omnia rubeant, rubeat afflicta, anxius

Abscessus  
in superficie  
intestini

Vomena

ex intestino recto, quod tumidum apparebat, interitum ad rectum vixque parte  
Cadaver aperui Peripneumoniae, inveni omni intestinum ad rectum vixque parte

quo tangit omentum & peritonaeum tanquam rami; erant Abscessibus numeris  
scitentia magnitudine urasi, qui aperti puri album effundebant.

A. m. mata matre audiri 5<sup>o</sup> a mortis mense invasit ad anici illico in  
ventriculi doloris incedisse, & sensim languidus ad mortem fuisse perductum Carum  
filium lamentabatur.

Venerum fuisse causam motu jam suadebat: Suspiciat fuisse prius barba-  
rigidum minutissima sensu & in vasa comitibus: tunc tanquam aly intestina

purigine, abscessus generant, & mortem nulla arte redimendam arceperunt.





doloris Miaci  
causae

1. Si nervi, qui ad intestina tenuia, obstructi fuerint Urinem non depellunt, & paralytici facti fuerint tunc interceptio urinis in aliud intestinum fit, ut in h. c. observatione refert. Et de his vidisse in duobus, qui dum vixerant multo ventris doloribus ~~se~~ erant correpti, post partum duobus illico horis, vel una: \*

2. Cum superioribus intestinum sit paralyticum Collabitur Superius & in non resistens intrat: ego in partu Puychianis, qui ab Academ. de Senar, vidi Hysteriacae Causae sunt vel obstructionum excrementis duris facta: vel ab urinis deglutitis, vel ab alijs Solidis Corporibus: quia intestina ita obstructa per se ipsum perdunt motum.

3. Contractio intestini, & substantia quae indurata: tunc neque flatu neque excrementa exire possunt, fuit inflammatoria &c. \* 2

4. Suffocatio intestini ilei in Hernia vaginali. \* In atonia: Mulier difficilissima alvo laborabat, continuo vomit sine magno dolore, tempore mortua est. intra tamen brevis tempus mortua est.

\* 2. ibi de vidisse intestina in quorum cavum digitum minime introduci non poterat.

Vermes perforantes in inguine  
Mestomii. de Athap. Intern. natura. pag. 52. Du Lipia 1718. 4.  
vide etiam Medical Essays. variis locis. Similia

Appendix nova

Ex Franciae Philosoph. n. 476. art. 6. volubus  
Puer cum cerevisiam biberet acidam in colicum incidit violentum dolorem. vomitus cum auidum cum excrementis mortuus intra tertium diem.  
Cadavere: Intestina crassa vacua inventa sunt: in illo hernia quaedam, vel appendix nova inventa fuit, quae obiaculum excrementorum deorsum fuit: erat longa tres pollices ejusdem ac intestini diametri: & clausum intestinum ita erat ut nihil deorsum poteras

Appendix

Fontenay Epus. Medus. Prima pag. 137.  
Appendix ilei minimi, longitudine variati, vi linearum latitudine non Cossi formam desinente.  
Gunsing observat in cadaveribus ex Mania defunctorum hujus in illo appendix inventi.



dilatatum

Ita dilatatum inventum fuit in cadavere puella 5 annorum Intestinum Co-  
lon, exapta ille recti parte, ut totum impleri adhaerent: dum vixerat dolori  
huius ventris torquebatur ad quae multa remedia Contra Vermes fuisse exhibita.

vermes  
symptomas.vermes perforan-  
tes

Ex Hildano lib. I. observ. 54.

Laborabat quidam atroci colico dolore, quem excepit Coli inflammatio ac ipse abrupit  
qui in sinistro hypochondrio proruperit. Kuum pure vermes simul & excrementa crui-  
tanti.

Colicis dolor.

Ex Nicol. Fontan. Consil. &amp; Resp. Medic. p. 84.

Staca parva

lapidea  
materia  
dentanti.

Juvenis ex illico mibo expiravit: Inventum intestinum colorem facibus vidu-  
matis, lapideam referentibus, distentum arcte adhaerentem

34  
Lymphatica  
Vasa

Nishi

Delectatus  
nig, Salace  
cedit. irac  
pronus

Ex Inu Bononiensis. tom. II. pag. 152 : Sæctum cani fuit best; vulnus contusum; videri  
datur videbatur: in iram proter, curru præstibat; idemque venere, gradibus cotidie phlegm  
ne casto Bistum, & idem et integrum alterum canem: caparati: Eadaveribus: jecur illius  
best sectum maly erat, frabile, impenitens rubrum, bily copiosior, varidly, amarior: vnde best  
more sanguine maveri, ut bily subdulce fiat.

Quæpote post laboriosum partum duntaxat hypogastrii observatur ignota: ma-  
nifesta febriens: Cadavers: non pectus superabat magnitudinem naturalem:  
liber 4 libr. pendens: Cavitate hypogastrii descendat: loci ubi non Arus  
a natura plerum est, multum corpore carnis magnitudine Castaneæ (qui  
feran lenis munus obbat.)

$\frac{8}{6}$  ibi. obser. 66.

xii-Canis sanus: post ablaturum lumen prorsus appetit; emat: & vomebat.

vide fol. 68. in Intestino Recto cum pinguedine multa morbosa.

Philosop<sup>h</sup>. Transact. N<sup>o</sup> 451. p. 426.

Ex vulnere lioni extra relicto, timor factus ad ganglionem proximam, Sectus, <sup>+</sup> perfigitur <sup>+</sup>  
ad dimidiam partem; reliqua intus: Vani evasit homo.

ad claudium partem, nescio.

Ex observ. Martini Bogdani apensis libro Lsery Cullit Anatomie. obs. II  
Rusticus de dolore immixto sinistro lateri ad spinam omni ille se extendit  
cum micro crante torquebatur du: moritur: inventum Venem sinistro  
complexant Scirrhorum magis. vid. pag. 213. edit. Banc. 1679:8.

*Carenzia* *Lenis*

Ex. Anat. hb 1. § IX p. 225. ab. 22: *Melancholeia*  
Colore-nigro Cetyl: maritum: Lien non invenitur.

*Melancholia*

vid. fol. 73

## Membrana

De Membrana Cellulosa, Adiposa &c. videndum Volum. II. Medical Observations &c. In-  
quint pag. 26. Vbi natura, functio, sed & suppurationis; multa que egregia simul & quae  
que eximia leges.

---

Harmattan, Ventus Septent., Africa

Journal Encyclopedique année 1782 / 1. Juin pag. 131. Tom. IV Part II  
Vbi ex ~~de~~ Franchon Philosophique Tom. VI pour l'année 1786 part 1<sup>re</sup> in 4° Londres  
1781. Dans le même Journal pag. 133, L'Harmattan est un vent périodique

Membrana Villosa.

Commentar. Acad. Reg. Jovis. tom 2. p. 366

Intestini  
Recti

Viro 50<sup>ann</sup> praeter asthma Convulsivum haemorrhoidibus multis laboranti socedit per  
aliam membranam molli spongiosa crassa, laevius exculpia, fastidiosa, domida fere  
maxi magnitudine; post multos die purulenta materia copiose excrevitur: cum  
della gr. aliquot reglatur ob asthma dolebat in intestino recto. (E. flosus erat?)  
nunc autem optime se habet.

Suppurato

Musculi

Mandibuli

Tumor Sarthensis  
in Causa.

Haller Opuscula Pathologica. Observat. V. p. 14

In Belgio frequens morbus: collum incurvatur, atque ad alterum latus inclinator. Scissus  
 Curationem in secundo oppento musculo sed male: Virique faciunt illi qui musculo caput ob-  
 oppontum tanquam paralyticum sinant. Sed quando a sinistro in ipso contracto stipu-  
 musculo aliud requirit remedium. Argento argenti vivi, embrochia, consolidantia  
 fomenta







Morbi:

Planch. ob. 31

La mesenteria putrida invenisse refert.

Lamproverde de Naturali molarum utri horis. pag. 229. 8<sup>a</sup> Lugd. Bat. 1636

Ventris  
dolores

Quella octo annorum valentinaria in atrocem ventris dolorem incidit: tres vel quatuor  
a post partum horis incipit, illa ferox ut inconvulsory, & admiranday corporis flexury,  
& saltem quandoque ob doloris acutitatem 4 vel 5 ped. altitud. deservit: vidig maske-  
rior facta moritur

Cadaver omne, forme Mesenterii glandula crassa carnea inter coagulato  
erant; chyle. exsily per glandulas non infleuit. &c.

abscisy

Ex Bonnet Sep. Anat. lib. 1 § 3<sup>a</sup> libro 37 p. 237.

Patientis intemperatissimay in affectionem hypochondriacalem incidit, adeo non  
sua continua crebris vomitibus & tristibus cogitationibus: sensit horrorem; tumor apposa-  
genae sinistro; idem circa pubem, major, minorque, qui vesicam comprimay urinam  
difficilem reddebat: causa, fluxus reducatur: tandem ita magnay excrevit he-  
mor ut ad umbilicum & sinistram latus se extendere & spiritum reddere difflicilem  
cachochymy facily per 2 menses sub morbo luctavis moritur.

Cadaver: abscisy inter tunicas mesenterii inventus est.

Item. Merdoni: de Absc. Intern. Natura. pag. 62 Ed. Lips. 1718. 4<sup>o</sup>

Hic Autor refert de multa cadavera videlicet tumoribus variis oriam a glandulis ducentibus  
duppe mesenterium stylis: hunc Scrophula, quo plerumque mesenterii, & pulmonum tu-  
moribus affectorum; sed hic paucis latus tumores sive Scrophulas.

Cystici tumores, sup-  
purations, malignitas,  
laser, cretacei: hyda-  
tides. Wharton Rem-  
iss.

Purine

obstructione

Hypochond-  
riacay mby

Scrophula

plerumque

atrophia

dolor, gravita-

tury, vomitus

alvus adinne-

calica, febri-

cula, diarrhoe-

algay, mors.









70  
Medastrium.





Flower observ. Medic. Anat. chirurg. Anglice. London 1755. 4<sup>to</sup> p. 144.

Morus et  
Sensus a Nervis  
diversis

- Observ. 38. Report: "The last mentioned Patient, whom I couched for y. Cataract, was afflicted with another remarkable Complaint.
- = He had not y. least power to move his right arm, but was obliged to
  - = suffer it to hang down useless, yet retained y. sensation of y. part.
  - = His right foot was in like manner affected, except that he could
  - = stand or walk upon it, though not so well, as with left foot.
  - = On y. Contrary he could move his left arm, and leg spontaneously,
  - = but what was more surprising, these were without any sensation, so that
  - = he could not distinguish any thing by feeling.
  - = And indeed when these limbs were dipped in cold water, or
  - = in warm, he did not perceive any difference (in y. left side: y. Skin of
  - = left side might be burnt, or scalded, &c. gave it no pain, or Cured or pricked
  - = with needle, without having y. least sensation. &c.

At. tunc judicat nervos sensus ad cutem decurrere, diverfos ab illis  
qui ad musculos, qui motum edunt.



Nov. 17.

Quam propono de Consensu caput inter Universitatem quorundam Cellorum investigabo adu-  
= ro in Corpore reuerti: annectendum est Sexi, & octavi parij Systema universum, maxime in  
= Abdomine, temporis potum sinit curiositati anatomicae indulgere; Expectanda istorum oc-  
= casio, qua factum, vel juniori Cadaver accipiam / odi enim talia in bruij inquirere quae  
= tamen mihi facile erit. In praeparatijs enim raro praeueniunt universum Systema servare  
= quorundam propositi implere. Sic bina Corpora, ut ex uno etiam totum Attenuarum, ex altero  
= unarum Systema si fortitum, nervos potius Eustachij: Intestin. aliquid.

Sibi, ut clarissime, dicam, fore paradoxon.

Concedo totum Corpus Consentire

Concedo totum Corpus Consentire per nervos

Concedo totum Corpus Consentire per nervos unice

Nego interim nervos Consentire

= Per Consensum Corporis intelligo verum doloris, vel voluptatis sensum. Consentit etenim  
= Corpus (ut ita dicam) per Circulum sanguinis: in eo Consentit per vasa: quod non in nervis; quia  
= demonstratum est omnem fibrillam nervorum esse Solitariam. Itendendum optius nervij  
= (vel potius ejus expansio) videt manerem; moventur mox omnes fere majusculi; ipsum cor  
= Celeriori motu Contrahitur: Peraguntur haec omnia ope nervorum: Sed aliud: fibrilla-  
= tur nares, per quas distribuitur rarij quinti parij (ut omnes afferunt) mox Sexi pa-  
= ris, totum intercostalium Systema, vagij, forte aliquid actarij paris rami, convelluntur,  
= Intestini movent musculos, qui respirationi inserviunt: Unde Intermissio. Brevis  
= inter illos nervos audere quij negare Consensum? Salvo meliori, ipse nego: Nihil um-  
= nervo nervij confluit: omnis fibrilla, distincta penitus ab alia fortis distinctissima ad  
= partem destinata: Penam; unicum musculum trahi in tantum milia fibrillarum motum  
= penam, omnem fibrillam musculorum trahi fibrilla simplicissima nervosa: non ne sunt tot  
= distinctae origines in medulla oblongata, aut spinali, quae junctae dein Universitatem in  
= volutae, faciunt, quod anatomici nervorum vocant: Si simul deferuntur ad partem destinata.  
= An non itidem omnis fibrilla Sibi agit? Quia in uno musculo a nervo, est ut  
= actio omnium nervorum in omnibus musculis intoto Corpore? Et an non itidem est bene  
= in nervis, qui sensum faciunt: Hinc concludo minus fore sensum nervorum cum nervo  
= non Consentire, quia nervus cum nervo nullum habet commercium; & quidem per nervi  
= intelligo ultimam Solitariam fibrillam. Omnem itaque Consensum puto habere in  
= uno sensorio Communis, non relative, sed immediate, nec desperso posse explicari, quomodo ab  
= ingratu Spectaculo, Sonitu, tactu, gustu, olfactu, imaginatione &c. affectum per ner-  
= vos sensorium Commune, per alios nervos emittit motum, qui facit Corpus Consentire, ex  
= ipij hydraulicij & hydrostaticij; modo asseruimus spiritum esse in nervis, qui actionem exerceat  
= Corpus subtilitatis modo est respectu nostri.

= Astrucius demonstravit ramum nervi cujusdam sic satis magnam, qui, oriens ex ple-  
= xu ganglii formi semilunari Vieussentii proxime ad plexum mesentericum ascendens  
= ex abdomine in thoracem & in auriculam dextram cordis quae basia, ubi plu-  
= res dividitur. Hist. Acad. Scient. P. 1737.





Quia tentantur ténacitate ita lapsa, ut inde actum ducant tumores  
laxi, magni, nullum pus, pinguedinem, sed sanguinem liquidum a-  
guum: Si aperiantur lanceola citius moriuntur *ut affecti*: Ideo me-  
lius est ut porte aperiantur & exsiccantur, & hoc modo vitam serius  
trahant. Si dolore nascitur, augetur morbus hic.

Ex Museo Imperial. Petropol. Libr. XVII. 118. n. 28.

Cotta foetus aliquore acidior ita mollificata ut nodus in illa potest fieri.

22de Phila. Bonfau. vol. 48. p. 1. pag. 237 § 44 by Dr. Pringley.

Fragilis, Mollis, sedens

Mollis

44/  
Oesophagus..



Inter asperam & oesophagum tumor quidem nascitur praeter naturam, aliquando lateris, aliquando corripit, primum coarctat, mox occludit penitus gulam: signa sunt angustiae gulae, spiritus difficili, gustus feror, sputa salsa, perennis salivae secretio, post digito explorata, tumorem, magis planum, quam acutum ostendit: Vidua hunc passa tumorem quous tantum aliquot laci deglutire poterat. ad mortem.

Cadavere tumor apparuit carcinomatodes: illic videtur per totum collum & tracheam erant, praeteritum circulum: ob has ita pressus era oesophagus ut stili introitus cret recusaret. Arteria cervicalis nimium distenta: angustia tumor carotidem comprimerebat?

Cum morte deglutire possunt, quia corpus tunc omnem elasticitatem amittit.

Cartilaginey

Ex Mem. Chir. P. tom. 1. p. 489

Ibi ex Sampsonis in Merak. Curior ann. 16— & Boice de oesoph. deglutitio affect. ex deglutitione impedita invenit oesophagus cartilagineus, in impetum contraxit, & ad longitudinem tantam, ut a clavicula ad ventriculum ne sui septem quidem admittere nequiver.

Ruptura ex abicefu

Heuter observ. 462. pag. 531.

Reperi quendam abicefu pulmonum laborantem dolore acutissimum tolerare per aliquot dies ad tertiam quartam ve veniebam dorsi; tandem hy mali succubuit. Cadaver aperitur: in pulmone invenitur marisupium tanquam gelatina, visum, mutuarum analepticon, quo contra morbum sordibat & haerebat, plenum: mirabatur unde haec; natus oesophagus, invenitur perforatus illo in loco ubi inflammatio, denique abicefu sui speciem dedere.

Boerhaave rupturam oesophagi vidit post vomitionem acutissimam in Comite Wafflerar.

Ego ipse Petropoli vidi rupturam oesophagi ortam a gangrena venterculi, nullo praecedente vomitu: simul ac rupturam sui clamat ager, & mori, & mortuus invenitur: sanis multa, quae per foramen oesophagi in cavitationem intraverat pectoris invenitur: dixeram ego, non sine dyssimula, Cadaver.

Oculi

Extrait d'une lettre datée à 5 Juin 1742 de M<sup>r</sup> Les Disciple de M<sup>r</sup> Albinus Professeur  
d'Anatomie à Leyde

= M<sup>r</sup> Albinus avant deux ou trois mois par un billet affiché ala porte de l'Academie  
= a fait inviter tous les Etudiants, & dans leur presence il a visité l'Anatomie de l'  
= cell apres qu'il a doucement osé les humeurs, il dit, Messieurs, Je voy vis mon  
= voir une chose nouvelle, bien que je l'aye déjà trouvee avant huit anney: il mit le  
= bulbe dans l'eau, & au Centre de la Retine il n'ay a montré un processum cum  
= Capitulo: Je donne ici l'idea comme je puy par l'oeil presente figure (sicet ruditer)  
= Il n'a pas ajouté l'usage d'eny l'optique. & la traite de la Generation Contra vermes

Inventum  
novum  
novum ann.  
1742 ad Albinus

$\frac{1}{n}$

17<sup>12</sup>/<sub>5</sub> 50 § J'ai entendu a M<sup>r</sup> de Buffon qu'il avoit trouve la demonstration par quoi nous voyons un objet  
avec les deux yeux seulement par d'une 13<sup>me</sup> partie, & par double: Il devoit aussi  
Nous voyons un objet clairement v<sub>g</sub> Comme 12 avec un oeil; donc avec l'autre ensem-  
ble nous le devrions voir plus clairement Comme 24; Mais par des experiences de M<sup>r</sup>  
Jovin nous le voyons seulement Comme 13. Or la raison est: l'addition d'angle  
qui fait le thalamus Nervum est de 115, ou 117. v<sub>g</sub>  $\times \frac{1}{2}$  l'objet qui paroit  
par le Gate a sera vu Comme 12. l'autre b Comme 12  $\times \frac{1}{115 b}$  Comme elle sera  
rencontreront il selon la diagonale, or la diagonale sera Comme 13 de la  
 $\frac{12}{12}$  v<sub>g</sub>  $\frac{12}{13}$  de la sorte nous voyons l'objet selon la longueur de la  
Diagonale; & pour cela nous le voyons Comme 13 & par Comme 24



46/  
Lingua



Pentamerus

Pentamerus per orbem in duas divergens lamellas. vide Hydrogonia Pentameri Contra

*Peritonaeum Scirrhorum in Hydrops: vid. 51. b.*

Hydrops: 94/99  
na:

Eius signa: incipit sensum & lente, neque propria valendarum signa mutantur: tantum mole noceat & quando Coniunguntur aqua. Mensura in faciem apparet statim tempore: omnia non naturalia munia rite peraguntur. H. H. Reg. Sc. anno 1707. pag. 510 ibi per 9 signa Peritonaei hydrops Cognosci docetur.

Suenter jugiter eandem figuram servat, mutaturque nimis sit sitis; nulla fluctuatio: tibia & femora raro elevari, vel prope finem.

Inter duos Peritonaei laminae Ibi aqua inter lamellas duas Peritonaei inventa fuit post mortem. Inventus hydrops. Cura ibi proponitur; Si incisio aperta servetur turunda & injectio- nibus depuretur & ad Cohesionem producantur peritonaei lamellae.  
p. 502

Scirrhus

Præter observ. 30 Ant. 1. <sup>ventriculi</sup> Dolor aurifabrum dolore rodente crudelissimo quæsi dicitur intermissione dolor ventri- discentur per 6 menses in menses in menses. mori: Solam spio dolores uli immari. inducitur dabatur brevis: purgantibus & vomitorij vix puerat: Cadere pylori, duodeni, jejuni initium scirrhi affecta capacita- tem cretante, cum Pancreate Scirrhorum.

Hydrops Peritonaei  
per 44 annos  
gestatus

Medical observations & Inquires vol. 1. libr. 2.

Mulier per labores violentos incalescit, petii subternacum cameram, humidam fi- gidam quæ; queritur tanquam si fagor concepta; venter dolore & circa hunc hos- cepit, venter ducendi incipit: nunquam puncturam aquarum ausa perforare. Cadavere lamella peritonaei separata invenitur; intra harum cavitate invenit & fuisse ad 100 libras fluiti fœdi, visci: vide locum





= Vid. illud inflammatum, saepe planarubrum & diffusum saepe etiam purulentum: Sed. Ro-  
 = leum in summi illius Arteriae Aug. Tunc callere deprehendit pancreas magnitu-  
 = dine & pondere hepatis, glandulae tunc, quae alio parva sunt, uti Colombini, pueri-  
 = tulentum, substantia autem tota fuit durior: Fabr. Hildani quoque pancreas  
 = non partem pancreatis in sciatoma duorum pugnorum magnitudine extensus  
 = notavit.

Durum Sa-  
 duratum  
 cum Vesica  
 fellea adhaerens

Melancholia

Hunter. Observ. 333. 4<sup>o</sup> Anglica edita. London 1755. 4<sup>o</sup>

Refert de duo cadauera apertis in quibus pancreas durum in venis, vob-  
 culam que felleae durum cymum fore clausum ob valvulas spirales  
 quibus obstruitur erat: ~~Idem~~ dum vivebant melancholico morbo de-  
 tenti fuerat (vixit magis, alter foemina erat) & mortem sibi conscivere  
 moriendo vix: Unde Hanc putat hunc morbum ortum plerumque tra-  
 here a vitio bily imminuto, & Succo pancreatici: hinc chyli vapi dua  
 promy in putredinem &c.





Pericardium Ex. Ac. Roy. scunt. tom. 2. p. 6  
Doy. Vn. Henryson le Coeur n'avait point de pericarde: observ. Du Verney.

Marki

Sanguinis Hiii  
Istius

Inflammatio et  
obstruction

Rebes

Signum hydropsis peri-  
cardii.

Medus! Gray. vol. V. P. 11. art. 56.

Oride ista hydropem omnem: ex cordis peripheria & pressionem ad basi diti, & languis-  
mum quae existant si cor premebatur.

Laborabat Divany ardorifima febre cum dolore pectoris diti; curasque apparebat  
Loto optimo, ex imperato praedictis nonnullis syncope moritur. Inventus  
est in membranis interseptibus tumor inflammatorius, qui communicabatur  
in parte cum pericardio. Petrus latus Divany de affectu partium. cap. VI.  
pag. 226 Deu. Granos. 8<sup>o</sup>.

De tabe pericardii in Sima Galen. lib. 1. de long. affectu cap. 1. & Petrus  
latus Divany. cap. VII de affectu partium.

Morgagni sedes & causa morbi. Epist. Anas. Medic. XX art. 36, Petrus af-  
flicta cubet, sic tumor (pleuritide laborat) ut in dextrum vergat latus. Caput  
autem submissum tenet, ut plerique eorum volent quibus pericardium  
ingenti aquae copia turget.

L. M. 1780

Experi.

- = Halesii nobilit<sup>er</sup> experimentum, quo dixit Canem, cui in aspera arteria innisist<sup>us</sup> tubu  
 = ad quem adaptata vesica in aere in aere vaporoso ultra minutum non posse vivere  
 = nisi accedat novus aër, vel externa pressio. " Vidi proprio experimento vixisse in eo  
 = eam aère vesica induso, sed Wahlgren adaptata anxietatibus & suspiriis maxima  
 = ad finem, canem per Septem minuta, sine ullo novo aere, vel adiumento externo:  
 = dixit unus medicus magnitudinis canis minuta quadraginta & sex, Equidem novus  
 = eo tempore per tubum episthormis versatili instructum, inflavi novum aërem ad  
 = priorem vaporosum. Ad secundam inflationem sibi relicto respiravit, anxie  
 = quidem per 5 minuta, & sic porro. Ex ii, qui aderant, amicus tribus diversis horolo  
 = riis notavit, vixisse animal propria respiratione triginta & octo, reliquum tempus  
 = quo pressa fuit vesica afflicti octo minuta. Vixit alter duplo maior canis  
 = minuta septuaginta septem & dimidium, in quo tentavi experimentum primo  
 = eadem, max. duplici vesica, qua caperet duplum aëris. Dura est medi  
 = cepi.

= Ater in  
veniculis  
post-mortem  
in hydropo.

Femina 40 ann. nata hydropo laborans ita difficili respirazione frequentissime difficultas  
conversatur ut litora facies, labia evadent, mortem omni momento expectans: mori  
tunc tandem: Cadavere:

Epiploon scirrhum: Peritonaeum crispum: Intestina contracta, vel ob  
adhaerentiam, vel aquarum pressuram: Vesica felix vacua: Pulmo pleure  
adhaerens: Pulmone vesiculae pallida erant, quae aere turgabant. &  
manu comprimebantur aer non exibat, tantum hilo perforatae subside  
bant & aer empetebat: nullam cum aspera arteria communicationem  
habebant vesiculae illae aëreae, unde ex sanguini illic adato ortae fuerunt.

Sunt humoribus seriosis putridis fatis & ad vesiculas pulmonum fusa  
adaltis ex his aëris elementa soluta aërem produxerunt.

ex sanguine  
serioso putrido  
facto aër fit  
intra corpus.

Difficilis  
Respiratio

lib. observ. XX  
Mecior diuturna respiratio difficili, quae per casum in aquas auctior  
indies evasit: Cadavere: Pars pulmonis stricta & vesicula nimium in  
flatae, & obstratae. // observat. XXVI. ibid. idem morbi eademmodi typum

Hepar.

Hypochondria  
cus, morby

vide fol. 30. sub Morby Hypochondriacis.

Vitium

Medical Essay, tom. V. P. ii. art. 58.  
Plere facto in pulmone repleri potest universae pulmo pure ab hoc vixere, seu  
tente, quia pulmone mortis non sint causa: vid. ibi Historiam, & ratio  
cunum optimum quomodo in cadaveribus sit mortis causa investiganda.

Sine pulmone

Ex Nicl. Fontan. Recop. Kurat. Medic. p. 55.  
Sua quadringis maximo extinctis Jacatur: hepate prope venam cavam parva gibbosa  
abscissa feda: nulli pulmones, vias supplebat vesiculae membranosa flate replen  
venulis exiguis manita ab aspera arteria ducentes arteriae. vid. Zacc. Lus. Bary  
admirand. lib. II. observat. 100 Kolomat. 101.

Phthis: absque  
suj. hepatis

Aqua seu ad  
ma pulmonum

Partere Observations touch des Cadavres: Perignon. 1751. 4<sup>o</sup> pag. 37. & seq.  
Per try observatum ostendit: pulmone aqua infertis invensae: dum vivebant  
difficilis respiratio, Tussis sicca: Pulvis melleus, frequens, obcurus: tamquam frigore  
eventu correpti: hic parum cura anni phlogistica proder.

Signa

Adhaerens  
Diaphragmati

Ex Partere ibidem pag. 44. Observat. singularis  
Nihil agnoscit tamquam si frigore esset corruptus; febris parva: S.M. post 3<sup>am</sup> in  
gens dolor ad sinistram lary audius, difficilis respiratio obortitur, ad costas spuria  
extendebatur: super venter cubabat audius, pulvis parvus, frequens, facies pal  
lida: moritur quamvis minus esset phlegma libenter sanguis.  
Cadavere: Vix dexter pulmone Colore roseo anteriori facie, colore hui  
do in posteriore; diaphragmati ita valide adhaerebat ut sine ruptione sepa  
rari non posset: ubi adhaerebat Colore puniceo tingebatur: hydatis in hoc  
lobo aqua plena inventa etiam fuit.

Erysi pelvis  
pulmonis.

Signum

Hic oculi palpebra inferior pedumque extremitates solent subdumescere &  
Bary Salby Diversus Cap. V de Affectionibus particulant.

Hydrops.







Succenturia  
ti vus.  
infetu urinam  
capere.

Urde Morgagni Epistol. 18.

Ex Instit. Bononiens. tom. ii. pag. 150.

Anatomicus Putius induxit animo nihil aliud esse, nisi diverticula quaedam quibus sequegetur, & subigatur urinum serum, quo renes fetuum plus, iusto abunde, cum inveniatur emulgentur transferatur, ut ibi sanguis ad fluendum aptior fiat. Et sane humani fatus vesica hoc tantum liquoris uncias capax est, aut ut maxime IV, quamvis toto praegnationis tempore urinae libras hoc minimum congregari in illam debeant; quare cum infetu allantoideis, seu pseudoallantoideis sit nulla ingruere derivari possit urina, existimat Putius hunc vrum Succenturiatam renibus tribui posse. observatio Fantoni probat: is enim puellam calculo laborantem, incidit mortuam; hi renes tamquam sacculi, reventi. Putius cadaver meretriculae hydropetory mortua; hi renes ita grandes ac sumptuosi, utque veri renes.

Morbi  
Cancro  
Hydrops  
Abscessus in  
parte externa  
re.

vide in M. S. de Mbu melancholici. pag. 121 & 145. hystoriam subfincem  
Philosop. Transact n<sup>o</sup> 482. § 2. Som<sup>o</sup> Glass  
Bulla hydropica laborabat, cui tibia non inflata: poru trinae emittebat, mortuus: Cadaver e: Pen  
dexter in maximum saccum aqua plenum excreverat totum abdomen, sedem implentem, & Diaphrag  
ma tendentem.  
Barre observationes tres de Cadaver. Despignan. pag. 52.  
Pus per Urinam exibat: mortuus, inventi abscessus in parte exteriori renum ex quibus  
pus ad vesicam pergebant: interjuncti, neque in vesica abscessus inventus fuit: fe  
bre laborabat suppuratoria dum vivebat.

Morbi

Bartholinus (V.) Cent. 1. hystor. 38: refert de melancholicum, natura, vel  
Cavis non ait, detruncatum aperuisse Cui renes succulentissimi maxime cavitate  
 ampla: ~~de~~ apud Bonet. lib. 1. § 3. ltr. 36 p. 237.

*[Faint, illegible handwriting across the middle of the page, possibly a title or section header.]*

*[Faint, illegible handwriting on the right margin.]*



Maxillaris

Nosti

Polypi  
in maxillari

Pluych. obr. 77

Intra maxillarem sinum polypus natus, ad gingivae descendens anterioris  
exspatus, avulsus molentibus aliquot dentibus. Vidi ego tumorem ingentem.  
post avulsam dentem inferiorem; excrevit immensus, ita ut os obtureret.  
radix mali in sinu maxillari erat: Chirurgi malum secundo exasperant  
re: mortua tandem.

Laetis testibus ~~laetis~~ fufit, respiratio afficitur: quia nervi, qui testis pertransiunt, diaphrag-  
mati inferiuntur: per immoderatum carum, & cum laesa jam fuerint fufis, inane afflicta:  
Hicobaculum dolet Cordis: vide Guenz Comm. ad lib. Hipp. de Humoribus pag. 227, & 228



Noti  
de  
Herniæ

Ex A. L. Hist. anno 1701. M pag 271. H. Mery Candidus

Ibi plex casus refert quibus visum fuit intestina cum peritoneo ad Scrotum  
descendisse: etiam omentum, Hæmorrhoides, Uterus, Spermaticea, ampullarum fuisse: Etiam Singulorum  
Musculorum aperturam ventris herniam comparuisse, Coniunctis Simul utriusque  
vis & peritoneo

Vide libro pag. 288 quando vasa inguina suppressio & caetera ve  
sica explorari nequit, tunc cum tricipite Cava (hæmorrhoides) supra omnia pa  
tibus, vel supra eorum Commixtionem ubi recti myceli coniunguntur per perfora  
ta vesica

Vomitus  
Singulorum  
vires.

Ichthoria  
curanda.

Alipier de Hummby & V. E. Vander Linden. pag. 322. tom. I.

*Guomedium arboribus terra, ita animalibus ventriculis X. nunti, Kalefacis X. nunti*

*Ventriculus*

*ingefat:*

*Dilatatio Abdominis ad corpus inque se extendere & implere lethaly, Vomitus, dunt adstricta:*

*Ventriculi Vide Historiam. Medical & Philosophical Commentaries Vol 2. Part. III pag.*

*294 ann. 1774. London. A. Duncan Scuto.*

*Pylorus.*

Scirrhus

Juvenis dolore ventriculi diuturno cruciatus, vomabat etiam assidue, animi deliquia: aliquot ante mortem heris vomente nigra: Cadavere.

Scirrhus inventus infuso ventriculi pugnus magnitudine aduani, materia nigra, tenaci refoetus.

Contractus

Ibi. obitu. 68.

In cadavere Nobili ventriculus ita contractus apparuit ut intestinum refoeret:

Lugd. Batavor. 1730. vidi in Nosocomio Cadaver apertum a D. H. Professore.

Nec in quo ventriculus eandem, ac duodenum capacitatem aequabat. Hepar autem minimum erat atque ingenti, quia ventriculum comprimebat, contractum.

Dilatatus Pylorus

Ibi. obi. 74:

Tame canina femina laboravit: tormina ventris assidue: Cadavere: tantum pylorus dilatatus tantum inventus fuit, ut digitor omnes manus introitus pervent.

pylorus dilatatus tantum inventus fuit, ut digitor omnes manus introitus pervent.

Pylorus Obitus

Ex Bonet. S. Anat. obitu. 33. tom. 1. p. 234.

Juvenis tempore cholericæ postquam potum multum, aut vappa, dabbu erat enim. Hypochondria. quum accipiant, incidit in potum indomabilem fundo: ructus foetidi, flatu in ebdomidia. nam defectum Anorexiae foetidas, diarrhoeam emulans, atum: Distentiones hypochondrii, metus tristitia: post multa adhibita remedia subsequantur, lenis nationis, dolentis, deliquia animi, edematosi pedes, fluxio ad aurem brachia. femur (An paralysis) ventriculi motu inveni. Cora vigilans moritur.

Cadavere: Infuso ventriculi abamento simili Copiosa & maxime corrupta materia foetida; pylorus Scirrhus contractus clausus, ut vix pennam intromittere posset. mesenterio Scirrhus, lapidosis, sanguis ibi contentus ater: reliqua nationem obervantia propter in corde multam pinguedinem.

De attereno, dato, malo. Nec institum sumptis, morbo?

Cancer, tumores

Ex Henr. Merbomii de Morbis Internis natione. Breide & Lepia 1718. 4.º pag. 42. & 50. Solor cartilagi-

Constantem anorexiae

Quis incipit quasi de latitudine praeterit exursum; post novam rupturam incipit de latitudine mucronata re fons cordi, ingenti quasi, aliquando dexteriorum, aliquando dexteriorum, dabit ista vomitus. cum malum, & crevit, simul ac animum alinuat, vel potulenta, qua reflectere subin-

re Gegebat.

Cadavere fundus ventriculi inveni puerit, & pylorus fluxus Cancro depasit tumore Arcum troy carum pylori arcant, qui dices glandulas inflata, referebant. Vesica fellea bile distenta, & Hepar bile distenta.

Equi, asini vesica fellea carens: Ruysch. obr. 31.

Deia felly

Seeger de ortu & Ingressu bily Cytica Diff. mag. Lug. Bat. 1739.  
 Ex variis demonstrat experimentis bilem hepaticam ex ductu hepatico ad vesi-  
 cam felleam adire per ductum cyticum: & quod <sup>bilem</sup> ex hoc translatum  
 de ortu ducere: tempore pastus, ventriculo plenus compressus estus Kintley  
 vesica fellea & exit bily in intestina: Ventriculo populo ventriculis duo  
 denum descendit & bily hepatica & Cytica per ductum communem in  
 testinum penetrare possunt: Deo stent & retinentur: Ad cum bily hepati-  
 ca pueris decernatur ex hepate, & per canalem communem intesti-  
 num exitus, ascendet per canalem cyticum ad cystim felleam, ubi  
 morata spissitudinem, quam umbilica Cytica ~~obstantia~~, acquirit.



§ Ex Obliortar. de chylori factu in vtero a Choro. Jac. Freu 1715. 4<sup>o</sup> pag. 46

Ductus cyticus Extent sectiones duarum cadaverum in quibus venter ductus cyticus valvulis spirales  
 obitus: talis confirmatio bili exanti venioram necit: que impedita morbo pan-  
 creas magnitudine aucta generat. fit illi flatuorum morbo ex terminis coctum  
 bus: unde pro hypochondriacis haberi.

Vesicula fellea vacua. on Hydrope: vid. 51. b. in Hydrope.

Baych. obs. 31.

lapis

Vermes  
intraeas

Calculus

Invenit vesicam fellea in cadavere in varias distinctas cellulas; tunicam quae bilis in Hydrope  
tortam, crusta calculosa esse obductam. Idem fore observavit in vacui, in qui  
bus vermes lati in poro biliario inventi fuere, qui bili ingressum in intesti-  
num impediabant: tunc bilis stagnare ad canalum illam post de crustam  
calculosam relinquit.

Observat. 87 ibid.

Calculus Hydropeum ascutum mortui Cadavere: tantum cadaver inventum, proies solita  
Zalam Hydropeum ascutum mortui Cadavere: tantum cadaver inventum, proies solita  
darius: Vesica fellea magna, valde dilatata humore aquoso, neque bilio, neque ama-  
ro, plena: in Canali cyptico inventum Calculus magnitudine pisi, qui duabus  
cellulam obtinebat.

vesica fellea adhe-  
rens colo & peri-  
toneo.

Ex Memoires del'Ac. de ch. Paris. tom. p. 172.

Femina 30 annos nata, pingui frequenter doloribus vehementibus regione epigastrica dolores  
tota incidit tandem in vehementissimos dolores cum totius ventris tensione, de hio  
aborta ventris evacuatione biliosa & purulenta evasit: post septem annos ex febre  
ardente moritur. Id morbi Ex. Comu. de downville fuisse huius generis?  
Cadevere: vesica fellea & hepar adhaerent colo, & peritoneo per longitudinem  
triangulum pollicum: vesica fellea parva; tota cavitas integre occupabatur per calculum  
qui vesicam universam adhaerebat. nequa quidem bili aderat, tantum hepatica.

pinguedinis  
causa

Erit ne pinguedinis causa defectum bili cypticae? Sana exiliente hepatica?

vesica fellea dis-  
tensi in ma-  
adhaerens

Ibidem pag. 178.

Vir 45 an. natus agrotare incipit rheumaticis symptomatibus febre; videbatur le-  
muy; paulo post marasmo confici videbatur: tunis Sica, sed apparebat, dormiebat, mury  
AKKXO ia: hepatis regio tumida. extendebatur tumor ab hepate ad ana illi, vriniae nu-  
brae turbidae: excrementa albidia: angustabatur ventris mury; delitum magis: mors.  
Cadevere: Vesica fellea dilatissima; quae superior pars hepatis adhaerebat; anterior pe-  
ritoneo: per molem suam hepar comprimbat versus duodenum: liquor erat  
limpidus viscosus amarus, ad quantitatem lb 20: calculi 6 a ibidem continen-  
bantur. m. d. v. M. S. similem leg.

Ibid. pag. 179.

Vesica fellea in  
sacco formata  
adhaerens

Femina 65 an. nata morbi hysterici, cum colici doloribus  
nec scirrhus a cony spurijs ad os illi se extendens: doloris curant. tandem re-  
venerunt cum febre; alvi admixta; irregulari febris cum profusa alvo, aliqui colici  
do: Venter tumor doloris: inflammatur adheparationem, puy h. viam querebat.  
claudabatur alio: haez du durant. tandem an du febr, mury; mors.  
Cadevere: vesica fellea adhaerens integre occupabatur ventris: parva purulenta hepate  
abruum inter duos musculos obliquos: vesica fellea sacy multy contrabat. inter quos calculi  
tray exallebant in quibus tray inventi fueri calculi: adhaerebat vesica fellea inte-  
tino jejuno, & vicinis partibus ita adnexa ut explicari non poterat: spilla tripla  
in eij corpore

Ex calculis  
bili dulcijs

Philosoph. Trans. 483. § XIX. Haller 111. Vesica fellea flavabile vix amara ph-  
na & calculi ad ingenti exigui, angulorum, quorum Unus ita obdulebas omnium duorum  
= cyptici, proprijs paulum chelidacho, quam prima cyptici valvula, ut bili, contra quam,  
= vider, ex vesicula promando expelli non potest. Dulcedinem mobile, quando  
= in calculos coit, per omnes reperti vider.

Ureters

Morbi  
apud dilatati  
Calculi

Aug. 26. 54

Mulier vehementissimè dolentibus urinam reddere. Due tota mortitur. Cadavere  
Calculi invenit in vesica supra insertionem vesicae: Supra tantum locum sibi in-  
xit ut ejus ~~hanc~~ Contenta esset in cavo: venter deinde valde Crassus in sub  
Hautia, blamphy.

Vesicæ coacti

Ex Philosoph. Transact. N.º 474 Art. XVII. pag. 207. Mr Huxham. A. Colici  
Femina calculi renum tuborum unius pelvis intus obturat uracem: collectus & dolores.  
Coacta manet: quoniam per Syphonem nesci fuerit liquor, ne fuita quidam  
ad uracem pervenit. Lege Corporis, Quasorum, quibus si humor defuit coalescent.  
Canaly arteriarum, Vrachy, vasa umbilicalia ascendunt. vide locum Ubi de  
Ventriculo, pyloro, hepate, intestinis morbi varij tentati, agerur, vide Coactum  
Vesicæ ob defectum uris ex omento, & peritonæo. vide M. S. Practicum  
titulo viscera coacta: vide Sy Cooper Anatomia ad Intestinum Colon.

Urethra

Morbi

Ischuria

H. del'Ac. des Sc. tom. I. p. 402

Miles ischuria laborans tentata cathetere exploratione vesicae, quae frustra, quia in  
 introduci catheter non poterat, nisi ad initium urethrae. Mortuus: Cadavere. Ureteri Sani: Urina putri-  
 da vesica plena inventa fuit: Cicatrix inventa fuit ad urethrae initium:  
 illa Cicatrix Canalem urethrae aetate fecit; hinc quae vocant Carnes ejus  
 originem trahunt, quamvis diverso sensu. Mery observavit.



Vericulae  
Feminales

Vener.

Placenta Ex fl. sc. hist. 1702. pag. 211. Schro. Linc: placenta in initio foetus mai-  
or, quam sub finem: crassior & sanguine turgidior ~~placenta~~ in initio: ideo  
difficilis abortus, quam post: & facilius intra uterum latent, quam post  
naturalem partum.

Menstrua . ibidem: Menstrua ex utero prodeunt: minime ex vagina. ibi re-  
fertur interitus menstruaty uteri os ad ad labia adherere tunc  
temporis menstruationis

Duplex . ibidem. 1705. pag. 47. Xla Mem. pag. 382  
In puella bimotri menstruy duplex uteruy, cum duarum vaginalium in unam defina-  
tum canalibz. hinc superfætatio oriri potest: Singulis his uteris unica admy-  
ciatur tuba fallopiana, ovarium, ligamentum latum, rotundumque.

Superfæta-  
tio

Vagina } Ex Philop. Transact. H. 422.  
obturata } Amyand Urinae suppressionem observavit oriam a sanguine in vagina  
obturata & adnata carento: quia ante 8 menses illa parturierat mulier, et  
duos ediderat ~~pueros~~ pueros. tunc myrthiformy Caruncula uti lacera,  
fuisse ut conglutinarentur & orium vulvae, seu antrum clauderent:  
propterea Urina supponebatur: facta Miliifera Occussata, & sangui-  
ny Huj exire; tunc libere Urina exiit.

Urina suppres-  
sio

Morbi Uteri

Hydatides

Molae

Ex Ruych. observ. 28.

Sunt hydatides in utero ex relictae placentae frustis, guttatae foetu per 2 menses: acedunt aliquando ut molae fiant. Hab. utero exant, quorum origo a placenta frustis, ac abortu felici, vel tempore gestationis proximo partui: hinc quando placenta junior, detrahitur, autum, vel 3<sup>o</sup> mensium, frustra relinquuntur molae exant: si placentae prope partum, sunt hydatides, hoc magis, quam ille uterum dirimunt.

ibi. obs. 33.

inventas hydatides fuisse in utero, ortas a placenta imatura relicta. Nam hepar crenes aliquando in hydatidibus absunt, vasis utriusque in vesiculis absentiibus: in Hydrops frequentius. ibi obs. 46, ubi hydrae hydatidum in ventrem humorem tenacem continentium.

hepar  
crenes

Hydrops

Dist. Ac. Scen. ann. 1702 p. 214

Post partum lochia, ob animi perturbationem molestas, retenta fuerunt: in hydropem incidit. Tunc cum tricipite causa abdomine aqua variis coloris, & consistentiis impleta non magna copia exant: intereunt subinde & umbilici sponte umbilici per aperitur, quo facto aqua collecta, fluent curatur mulier. Venter nunquam ita tumidus fuit, ac hucus; (Illa puto ex sanguine retento, corporis, sanguinis, quo compage non destructa, lochiorum ortum duxit hydropem).

Scirrhus

Polypus  
cordis

Philos. Transact. n<sup>o</sup> 481. § V. pag. 285

Anna Hicks inter 30 & 40 annum frigore correpta laborabat peripneumonia pulvis depremi, cordis palpitatio difficili spirare. J. M. celebrata partum profuit: cordis palpitatio, dolorque manit. Cadavere

Venter elatus ita ut gravis putaretur: apparuit uterus magnus, durus quam valde: inexteriori superficie duo corpora dura pendencia & adhaerentia ari magni tudine; duo alia simili, quorum minores protuberantiae apparebant: Substantia harum protuberantiarum non ita compacta ac dura ac illa uteri: ovaria & tuba sane fore. Substantia uteri cartilaginea.

Similem refer Ruych. Obs. Anatom. X. n<sup>o</sup> CVI. in vetuli ab illo observatus scirrhus: sed hoc feminae cuius in histona foetus mentio laevae erat Caustatibus adhesionis variae. Corde dextro polypus carnosus.

Inflammati non  
utero uteri

Ex Hist. Bonon. tom. II. part. 2. pag. 185: vide totam Antoniam NIS. de morbo Melancholico &c. pag. 148.

Fetus extra uterum.

Ex Hist. Bononiensis. tom. II. part. III. pag. 251.

Similis ibi Cypriani historia est: fetus novimetus in cavo abdominis inventus: Corallae via sunt: dum pariendo tempus erat uterum aperiebatur ac in vera parturientibus, quod negat Cyprani. 2<sup>o</sup> nullum gravidationis signum certum esse: 3<sup>o</sup> operationem qua fetus extrahitur scilicet abdomine periculo non careo: ut Cyprani affirmat: hoc enim mulier facta operatione mortua fuit: placenta multum turgida vasis intra abdomen inventa fuit, unde per placentam nutritivum perinde naturam tunicae, seu sacculi in testino illo adherere ita firmiter ut per difficile dona laceratione extrahi non potuit.

## Ovaria

Signa partus  
peracti mea  
desere.

Ex Hist. Ac. Sc. 1701. M. p. 103

Quando ova impregnata ab ovario exeunt ciatrix relicta est: per quam in cada-  
vere cognoscitur quatenus dedit partus femina. Ita vidi in f. 3. 11. 12.

Exhas. etc. Scien. torn. II p. 244 - 245

Fetus inveni  
ibi

In ovario cyusdam facinorae abiectione tentato inveniit 2 May in mandibula  
superioris, & dentis ira absoluti, ut horum <sup>post</sup> aliquid sibi decem annis jam natus vide  
retur.

— ibidem pag. 91

In ovario puellae 18 ann. nate apparbat infans, sed monstruosa figura. tamen  
dentis oculi, capity rudera observari poterant.

Ibidem 1701. M p. 109 & seq.

Fetus

Intra ovarium inventus fuit fetus.

Ibidem 1702 M p. 138.

Febri

Fetus

Ordi Philo. Vany. n. 466. p. 223.

Hydrops

ovarii Tympanit

Communicavit mihi D. Kaau Oberh. ovarium cum cubi Utero, vagina femina ju-  
voni ex frigore vi extinctae, quod ovarium aqua supernatabat: aperui lanco-  
la exit flatus multus & perum sanguinis liquidi. erat dycentus plus solito, nam  
fuit factus hic tympanit inflando arteris, cum tunc depleta pueri  
pugnum pueri aquabat. Ille ovarii; Runc amon. emi dedit; hoc mihi Dom. Kaau, qui infans  
dulerat.

Rumor obrev. 60: Cent. 1.

Refert viduam postquam antea, peripneumonia affigere incute subiepto, palpitanti.  
by Cordis, varia gravij fluens ex arte adhibita remedia, cum S. M., tum contra  
inflammationem & Spirituum ataxias moriam subito Catadysse.

Gangrena

Cadavere: Mediastinum pleno sero sanguineo: pulmo inventus materia  
purulenta repletus: Ovarium sinistru ovum aquabat, colore nigricante, in  
tui gangrenam referebat; nucleus intenu erat grumoso sanguinis putrefacti, palp. cord.  
torion hic for illorum hystericonum quibz erat obnoxia, & palpit. Cordis.

diffenta, hea-  
tomata

Ex Hist. Academ. Royall. de hum. an. 1707 p. 26.

Nihil ibi lecta dignum prater mollem ovariorum, quae parit ad, pueri con-  
ponendo macerando in putredinem conversa genere.



Observatae tubae Fallopii fuisse obstruatas, aliquando ad uteri insertionem aliquando ad eam non. Causae sunt partus dolori admodum inflammationem tubi inducentis, vel ventris dolori inflammatorii: Stronvaia A. Simul ac tubi huj. esse claudas ovarii esse connexos:

ibi observ. 84

Aliquando lochia per tubas Fallopii valde dilatatae, in pelvim intrarunt dilatatae.  
Lochia.

Memoriam acciperunt.

ib. observ. 85

Eram sanguis menstrui per tubas Fallopii ad ovarium rigeat, dilatatae Menstrua.  
pertingere & claudere potest.

Fetus intra

Ex Hist. Nat. Sc. 1702. M. p. 208

Joemina cadit in genua succussu violento post 6 horas acerbis doloribus ventris. Inquiari coepit, dolores per 28 horas assidui fuisse: menstrua tunc apparuerunt, singulis diebus minora evadentia: haec per septimanas sex. tunc frigidus sudor, facies pallida, venter durus, nausea assidua, inanis, suffocata respiratio, fere aphonia, leptomymia, pulsu parvus intermissions: mors: dum in extremo mortis labore erat de dolore ventris acuto, de quadam valva decussata & infra diaphragma sita arriare querebatur.

in Cadavere: foetus intra tubam fuit, & tuba fracta: vere ob casum, ex quo omnia mala.

Foetus

Ibidem 1702 p. 198

Joemina ex alto cadens in pedes gravida post 5 hebdo madoz foetus in Corruptus acuta, mortuus intra v. dies tuba fallopiana foetus in ventris  
cavitate  
venitus: Ibidem Doct. DuVernay monstrat foetus in cavitate ventris  
inventos prius intubis fuisse, & ad ventrem fuisse protrusos.





Cuncta calculosa.

Puella ludens pilam ambrae parvam in naves degit. ibi mansit occultata: do-  
lores deinde pariebatur molestos: 14 aetat-anno sternutando pilam eiecit  
Cuncta lapidea obductam: Idem cum cerasi nucleo nase devento obvenisse  
ibi refertur:

Inde evidentiſſimum est omnes nostri corporis liquores aptos natos esse  
ut in Cornuam substantiam, calculorum evadant, Simulac plus solito de-  
tineri, forori.

Valvulae cordisValvulae quatuor in Arteria pulmonati. vidi Morgagni Epist. 34 n. 15. Sed & Cassia Alabrum

Morti

osseae

Physch. obervo. 63.

91

Mercator diuturna orthopnea, ante mortem pulsu debilissimo, ut vix percipi  
posset, ischythymis sub avidis moritur: cadavere: valvulae semilunares omnes inven-  
tae <sup>in</sup> laevis & connexae simul, ut nulla, per quam ex corde sinistro sanguis ex-  
iret pateret exitus

Foramen val-  
vulae semil.

Vidi ego in Valvulam semilunarem ruptam, ita ut foramine esse  
aperta, limbo valvulae hujus apertus erat: Ager dum vixit profunde in  
pectore dolorem sentiebat: palpitacione Cordis ingenti detinebatur: mor-  
tuis tandem: hoc accidere possunt per verbera & Contusiones  
violenter in dorso; & levandy ponderibus uno Conatu. Petropoli San-  
-hant Pontificum Chirurgy demonstravit mihi.



Simal ac alveoli dentium carne, vel tartaro obturatur denty vacillant, cadunt:  
Etiam illi, quibz gingivae deficiunt denty cadunt, deficiunt ob  
eandem causam. vel male affecta maxillae oris.

Vesica Urinaria

Oleum agnidalium  
dulcium cum  
urina retentum

Ex Instr. Bononiensi

tom. 11. part. prim. p. 218

Refert Baccetony ibi Medici lithotomy puellam febre ardente detentam ychuria con-  
ruptam fuisse 3<sup>a</sup> a morbo insultu: oleum agnidal. dulcium medicis exhibent: in qua  
nam urina suppressa erat: cathetere immisso die 4<sup>o</sup> 5<sup>o</sup> 6<sup>o</sup> 7<sup>o</sup> urina hinc plures  
exiit: At septimo res mira, exiecit Urinam duam cum grana octo, plura, quam  
den assumptas, oleum agnidalium dulcium. Tertio antequam assumptas, puri-

Colligit ex hy Baccetony opus esse ut ura parula sint & inventy honores  
quam anatomici urina inveniant, alia per quae alvutriculo ad vesicam Mledobum  
ibi nam quodvis.

Morbi.

Lapis

Pygichius observat. 89

Quoniam 25 cui lithotomia fuit administrata, tenaculis calculus ob ingen-  
tem molem, cum totam vesicam impleret, extrahi non potuit: Vesica admo-  
dum crassius pollicis crassa erat: in quā interstitiū materia purulen-  
ta erat similis purguedini fuisse per ignem.

Sap. conf.  
da. purul.

Hernia  
Scroti

Fuit hernia scroti vesica illic descendente: ita Raych. vidit. observ. 98.

Calculus  
in substantia

Ex Mem. Ac. Sc. 1702. M. p. 26. A. Livre

Inveni duo calculi fueri: intra vesicae tunica. In rene sinistro in interno ut  
cy inventum, & a calculo expulso jam formatum, per ureterem descendens & vesicam  
minutus detinebatur: inde abegit & calculi recentis. Hi calculi reddere vi-  
rum facillime possunt: investigati cathetere frustra: Cognosci morbi potest si  
digitis unius in Intestino recto, & foraminis in vulva & cathetere intus vesti-  
cium calculi comprimatur: facile inveniri potest: & cathetere vesicae  
tunicam descendere, ut in funderam cadant vesicae. Cognoscitur morbi ex  
viri scoto lactey.

N.B. ibi demonstratur fere Calculum vesicae parietibus intus  
adhaerere non posse.

Calculi in sacco re-  
positi in vesica  
inventi — —

Philosop. Transact. N.º 462. p. 11.

# *Intestinum Cecum*

*Intestinum Cecum* 2. Ductus proctofusus vermicularis caeci est ut in eo materia liquida tenuis separatur & ad caecum demittatur, ut faeces ibi densae fiant cum illo liquore multum facilius in Colon introire possunt absque: multis glandulis, per quas Sucus ille solvens separatur, constat Proctofusus ille vermicularis.



167. *Sternu*. 26.

Sanguis ex-  
tra vasatur  
in abdomine  
Corde jejuno

Appendix pinguedi-  
nosa

*Lien pueri dny*

volubly -

Ossa fœtus, qui  
in ventris cavitate  
erat, per J. R. emi  
sa

Colici dolores  
flatus multi

Recti Intestinitrismus quem recto asclerodis,   
 venena affecta: recti intestini:



Morbo

Fissurae  
tabulae inter-  
nae

Ex J. P. P. obs. Anni 1672. 8<sup>o</sup>. obi. 2.

Cranium

63

Quidam sceleris in occipite ictu, contudit protuberant, foras vix latus: febris, Convulsiones; tripano san-  
guis supra mentibus laniatus exiit: 6<sup>o</sup> mortuus: Tum cerebra aperientur cranium guttas sanguinis stillantes sanguinis  
ex interna calvaria: Dissecto Cranium foras calvaria illaesa; interne variae obunda tabulae Venae, ap-  
paruerunt: Quae mater lunata, cerebrum syderatum; venae leucae, ad basin cerebri, Rite mirabile  
Sanguis concretus.

Cerebrum syde-  
ratum

Sap. 50 § VII: quibus encephalon απαλεισθῆναι Corruptum (sideratum vertunt) fuerit tritus  
minuitur diebus, si vero hoc affugerint sani fuerit. // Hippocrati hoc verbo non indicat integram corruptionem;  
aliquando ingentem inflammationem & profluvium, ut ait 3 de Morbis Cap. 4. vide Van Swieten Comm. ad  
ap. B. 432.

Ibi observo. VI.

Tumulentus cadit; attonitus fit, spiritus difficilis, vox suppressa, oris spuma: moritur: rima in calvaria  
inventa: Sanguis videretur effusus, supra lingua cerebri manducata.

Epist. can-  
apoplexia

*Intestinum Rectum*

*Coecum*

Morbis

ut sine leuoratione tanq[ue] nequirent. Colon excrementis duris repletum erat: quorum  
multa liquida existerant.

Ex his sequitur

Après tout ce Constatant il n'est pas difficile de conjecturer quelle a été la cause de  
cette hydre malade. L'anatomie nous apprend que l'adherence du Intestin fait en-  
tre eux, fait avec le Scrotum, en diminuant considérablement le mouvement peristal-  
tique (voyez l'anatomie de Couper dans l'explication de la planche 24 par-  
consequent qu'un Intestin Vienna a été adhérent quelque part aussi tout le  
excrementy vont être poussés plus lentement. Avec moins de force, ils s'accumu-  
leront plus lentement, ils retarderont la matière qui les suivront, & par là  
qui ces excrementy font dur. Capable de blesser, comme de rochers de pierre  
ou autre chose semblable ou que des humeurs aigres & bilieuses se joignent dans le  
Intestin, & s'arrêtent à l'angle aigu du Colon de l'organe il viendra à l'organe in-  
flammation, emie, ulcère, & enfin gangrene sur tout dans un Corps de chinchin.

Ex versione Bremens.

Testes Patholog. lib. VI. cap. 2. pag. 158. Edit. Ultrapet. 1656. 4.º

Diagnosa  
ci, excrementis  
admingentis

Quella de penis cum duritia laborat sollicita mesor cydonia exstetur, reprimetur  
inflatione: inflatur abdomen distenditur, vomit faulenta, animi deliqua: mors.

Cadaverem invenitur coecum obstratum cydoniato: ruptum per usum foramen

Contenta in caecum abdominis exirent.

rester tu  
miffi deli  
quis, vomit  
mors

Pinguetudine  
Mafia.

Vide pag 28. lib. Mento pinguisimo duro.

Callus

Callus fit ex multis laminis perennes conjunctione incumbentibus ad eam fore-  
 naturam accidentibus, minime vero ut aiunt ex succo ossis ad fracturam col-  
 lecto: probant experimenta capta in iis qui scabitis acerrimo fuisse corro-  
 pti in navigatione Archiballaji Rami, in quibus cicatrices aperiebantur  
 & Calli omnium disfracturum demovebantur. vide *Discourse on the*  
*Scurvy* by D<sup>r</sup> N. Lees *diffinens libri* "An Historical Account of a new  
 method for extracting y<sup>e</sup> foul air out of Ships. London. 1749. 8<sup>o</sup>  
 pag. 93 & sequent.

Ex Mem. de l'Acad. de Chir. Par. tom 1. pag. 271

Per longum cursum doloribus femoribus ingentibus prehenditur Juvenis rotundus, languet, solum  
augetur tumor ad immanem molem totius femoris moritur.

Cadaver inventum a femore infra trochanterem minorem fractum: experiente, quod  
fuit fractura, ex qua superflua origo horridi huius tumoris: in medio huius tumo-  
ris substantia sicca fuit inventa.

Morbi,  
vulnere,  
calculi,  
vermes,

Ex Memores Sal Acad de Chirurg. Par. tom. 1. p. 332

Vulnere sinus frontalis ita repleta curatu non sunt ut plerumque credimus: cavari ibi exempla  
pene curari: ex hoc enim manu Trepanum administrandum non ducunt Magistri: sed  
si ibi calculi, vermes extarent sine manu ~~non~~ solidandi vulnere administrari po-  
terat: Magnus Boerhaave vermes sine frontali digens, & ex affatu frequenti fla-  
vum, in quibus Sternium semina latent proventumque fumo Annabaris interfo-  
cit & curati Rotterdamensem foeminam. ita & ore illius audiri.





73  
E 34

Lien

Lienus Mori  
Magnum  
Scherhorn  
idem  
Petrusdam

Ex h. An. Bonis lib. I. § IX. ob. 23. p. 229:  
 In hypochondriaci cadavere Lien 4 lib. pond. aequus inventus.  
 Ibid. Lien Surrhorum inventum ob. 24.  
 Ibid. ob. 25.  
 Ibid. Ob. 29. Suspensa Mortem sibi crepavit miser maniaq. hypochondri an-  
 tea veratus: invenitur detracta tunica Lien puridus.

99  
 Hypoch.  
 morbo  
 idem

Dittus Poracius

Communicato cum vena emulgentie vid. Mem. Ac. Parif. tom. X pag. 462 seq.  
X cum vena cava inferiori per unam, emulgentem, lumbarem vena-  
que Ibidem. pag. 501.



Ex Philosoph. Transact. n.º 475. art. XXII. pag. 336.

Femina doloribus ventris, gravida, per triginta hebdomadas p[er]p[et]ua; p[er] per annum exiit: Vetus.

Clausus erat, & infans caput extra uterum tangi poterat. mortuus.

Adhuc in tuba dextera infans mortuus v[er]o mens. in p[er] Conventu; et maxilla ad os matris.

Adhuc in tuba dextera infans mortuus illo in loco fatus anhelans fuit; Deo, in matrem.

Mortuus  
fatus  
in utero.

Et Costa ad spina cohaerebant: non movebatur illos motus illor[um] frequent[er] in utero in utero voluit, ne r[ati]o.

Et gestacione fetus Providens Natura motus illor[um] frequent[er] in utero in utero voluit, ne r[ati]o.

Et exdant cartilagine ad motum.



76  
ex22

cor

all  
the  
page



Morbi cordis

Polyppy cordis  
dexteri

River. obs. 77. cent. 2<sup>a</sup>

Hexagonaria pingui admodum religiosa, meditationibusque dedita per 15 an. Difficili respiratione torquenti capiti; scaly vasa adhaerere non poterat, quia quiesceret; tentata carotida ne muscularum massas. apoplexia tandem. Intus erat inaequalis recurrentis lingua. Is in pulsationibus. Cadavere: auricula dextra polyppo carnoso plena: ventriculi dexteri parte interiori putridi reger, exulcerati. Lase putridi, diffusum ad gasti. tactum. Pulmones siccato poly. / dum agrotabat nulla Tristi concipere fuit.

Polyppy

— ibid. observ. 21. cent. IV.

Generosus vir cum Rhodano nascens naefragium ita timuit terrore fuit perculsus, palpitatio, hinc incipit palpitatio, difficultis respiratio, pulsus inaequalis, pedum tumores: morituri respiratio. Cadavere inventi ambo ventriculi cordis sanguine coarcto repleti; in Sinu iro cordis ventriculo inventa sunt duo carunculae rotunda, ovellana magnitudine, arteria aorta atium praescludebat.

Atrocis: seu  
Miserabilis

Ex Barre observationibus tunc dy Cadaver: Despyman. 1751. 4<sup>o</sup>

Ex Gonorrhoea, Nely in abasum: symptomata praefasunt: in cadavere poly in ore poly: inter peritonaeum & pinguedinem ibi Anatam: In ventriculo sinistro sacculi parvi, inventus pure plenus, eisdem congestia. Scelery, simili illi, qui in petri inventum fuit.

Hoc in agrotato dum agrotabat palpitatio cordis adebat, febri; pulsus frequentis inaequalis, intermittens. Difficilis respiratio aberat, quae in Cordy polyppo vel aneurisma. Difficilis est.

Ex Institut. Bonon. torn. 11. Part. 111. pag. 485

In arboribus non  
sunt: Vena me-  
sentericae hoc praestitum  
officium

Aves quibus in pastu miscelatur minima ferri; in harum vena mesen-  
cis repletur notabiliter apparuit propter ferrugineum colorem, quo eadem surcu-  
li ab invicem distinguebantur, praesertim ubi vasa haec a tubo intestinali ad  
mesenterium distinguuntur: "Vasa haec hoc modo a ferrea substantia co-  
lorata, eo semper in loco apparuisse, in quo eadem oriri videbantur ab  
eis intestinis, quae adhuc contentis intus chylo distenta erant; in iis vero  
quae jam fuerant eodem depleta, nullus erat huiusmodi color videtur, ex  
quo vix veropaulo remotius ab ipso: id est versus mesenterii ansem,  
ubi corpuscula ferruginea secundum vasorum directionem disposita in-  
veniebantur. Consentanea Perimenteria, Pyerica, Brunerica in anse, gallina  
in Acoma, Artore, facti sunt chylum ab intestinis, non in vasa chylica  
quae nulla sunt, sed in mesenterica vena immediate transferri



Thymus

Ex Instit. Bononiens. tom. II. Part. I. pag. 148

Sam Bartholinus, Munckius, Meysterus, Morgagni, Vitulinum thymum longa maceratione emolliore, tum Calbo unum, aut alterum maiorem lobum, detractis tenuioribus perforant, albicans ex utro humor lacti Consimilis: Butyri hoc additis, por in Cistram quam fecit, expresso humore Cannulam immittit atque inflabat, aeris hec ex aliis in aliis permeabat vascula, Globulos vaivarios pervadebat; qui transiit aeris de Cellulosa membrana omnes Cellulas investiente suppurationem dabat: inflato ita thymo aeri exposito, pendente ad succandum, occurrunt ramenta, quae sunt carnosae dicuntur: haec cellulosa tunica in renibus, hepate Cerebro, sic tractatis non apparet.

Tunc vtrum statuit ex observatis thymo: hunc vicij datam a natura ut pulmonij vtrum adimpleret dum fanguis vtero inclusus est: Notum jam Coupe-rum coloratam Coram per ductum thoracicum adactam in thymum incidisse, tunc thymum chylum subigit, ut in subclavijs venas subinde mittatur, vel ad sacrum: abundat thymum dam hoc ad modum mammillae, Laburventibus venis largiendum: abundat thymum quam plurimis venis sanguiferis, quae in ipsum passim excurrunt a subclavijs, a tracheis, a jugularibus, a mammarijs, aliquando a proximis, vel aorta vel venae cavae ramusculis. Liquor thymi naturam chyli resnat: ad ignem non coarcescit, ut serum sanguinis, albumen ve ovi.



## Ganglion

Ex tom. II Histoire des Académies de Sciences de Berlin 1748  
pag. 108: A. Ebert.

Loquitur de ganglione morbo, seu tumore, qui post vim illatam levandij penderi-  
bus in metacarpo oritur: apertus materiam butyraceam continet: oritur ex  
multitudine oleo, quod membrana cellulosa que fibras singulas muscularium  
fibrarum amplectitur, & ad tendinum adiungit: si per vim, contusionem, ve  
fibræ aliquæ illius membrana disruptæ rumpuntur, hinc contentum oleum &c.  
totum in ruptura, & ganglion fit: si per amputationem extirpatur, tunc  
symptomata inflammatoria & Spasmodica oriuntur non sine Exerimine  
si Audiat omnem non adhibetur Curam ut symptomata sufflammentur.







Supra delectae

Commentar. Acad. Reg. Gotting. tom. 11 pag. 366

Puella undecim annorum paraly. Universali Concepta: manserat motus musculorum faciei, voci formanda, diglutationi, in reliquis motus et sensus adoluit. Functiones animi & sensuum organa integra. Cranium, post mortem explorata, ita erat conformata, ut nec sutura coronalis nec sagittalis appareret. Omne temporum Conformationis occipitis, ut & omnia sphenoidalia dea cum temporalibus multum cranioformata.

(80)  
406  
Paralysis  
Universalis

*Vmblicus*

Scur. 31.

In cadavere umbilicus ad vertebrae accedebat; ita intestina disjunxerat ut in pedem recondita invenirentur: linea alba, muscoli qui recti super aortam & venter lumborum innumbebant: mesenterium ita dissectum ampliatum quae ut latera, pelvis quae, ubi intestina pangebant, occuparet; Cum in vivis erat proculdubio per arctae micatio in umbilico sentiebatur. quae mala quos dolores, quos Convulsionum miser non essent?

82  
Epiglottidis  
Hely

Haller opercul. Patholog. Lib. 8<sup>a</sup> p. 12.

Vox extincta erat; in vtroque oculo tubera craffa detrecta: dimidia  
pars epiglottidis ulcerato tumore tecta, & passim erosa.

Laucedo  
Vox extincta





De febre detentis Septuag. & Orthopnea: moritur. Causa gelatinosa sive concretio circa vasa sanguifera: constricta est, per Tenacum Meningem repentina: tum serum intrinsecum laterale, ventriculos: .... quales intra intra pumey versantur. Circa medullam Spinalem. .... Morgagni sedes Morborum tom. 1 pag. 130. Ed. Ven. Gal.

Aspiratio laesa  
Intra thoracem  
Extra thoracem  
In cerebro  
In collo  
In Venire

Idem n. VIII de Mithere: Sanguine tingida Meninges Tenax omnia, & ita vasa que medullarem trapiunt substantiam. Cerebellum laxissimum: Cerebrum autem non. n. II  
Idem videb: diffitem respiracionem frequentius furi a grandi hepate, a pancreate seroso, a tumoribz diaphragma comprimentibus

In collo causa

n. 12: 13. 14. De Pulla asthmate laborante, pus spumante, extincta voce: moritur invenitur abscessus asperae arteriae posteriori parte adhaerens, Cartilaginez labefactionis & Mucosissimum Virum Venoroso morbo (Stenosis potius) concepto, celeriter curato, quia dum putrem adhuc illum contraxerat, circa XL annum etatis per totum collum tumoreis pro tempore capivimus, quos induratis, sed ad ducere ignavis, chirurgis cum suppurato videret, Cauteq. remediis scilicet annu molimine adhibuit: Quod fit mox ad minima motu respiratio laedit, ad levis vray: pinguis cum esset, & tubercula sicca, humida aliter, & tunc tontoretur vocat me ut medelam illi adhiberem: annuo: frictio-  
nibz ex mercanali ungu. cum camphora per 25 dieb. cum decocto lacativo suffrag. n. 14.  
parvula morbum aggredior debellandum: Caput moritur: sed post VI annos malum vehementius revertitur: & sub difficilissima respiracione, voceque extincta, miserime moritur. Cadavere inventus tumor semihom. durissimus magnus asperam arteriam comprimens: pulmonibus laes.

\* n. 13  
Sicore potest  
epimus, & in laty  
pulvis optimus  
color facies: op  
penny, ut dany  
ni, hic accusans.  
vid. ibi Morgagni

Fontenay n. 12 ibi. fere eandem afor. quam vide quon Morgagni n. 12 citat:  
Et ibi n. 15 in Octogenaria similem casum

Laesiones intra thoracem

Ibid. n. 18. pulmonum bronchia ab aspera arteria oriunda in cartilagineam sed viscam naturam mutata, tum in senibus vixaginta vixagis, cum in senibus.

Cartilaginea  
& circa  
fura  
bronchia

ai n. 20 calculos inveniri intra pumones: minores, praegrandesque: Tuby sicca febris macis, dolores punctorii thoracy, sanguinis spumum & haemorrhagia ad motum usque: Suppurationes: Lac tunc noxium: olea amygdal. dulc. larga assumptum copia.  
n. 24. ibi. Pulmones conest.

Calculi

Carni, corda-  
gines.

Hydrops pul-  
monum & pericar-  
dii  
Causa: Scabiez re-  
pulta vide  
ibid n. 34.

Ibi Epistol XVI. p. 136. n. 4. 6. 8: Ex cadaveribus jam facti hydropis signa. intellige n. IX. Ledum tumor. Sitis: faucium siccitas: pulsus humilis, tussis irrita; catarrhalis materia spumosa erat.  
N. B. n. 35 ibid, ubi ostendit expurgari subito post inceptum somnum, patho-  
gnomoniam non esse signum hydropis pectoris: Cum Polonia Senatorij nulla nulla erat somni cum periculo suffocationis interruptio  
Ibi n. 17. Male expectatus vir de aqua in pericardio inventa judicium foret febris erat symptoma collecta aqua in pericardio & caeva pectoris; Cum putrescere incepit febris: putrida jam. morbo gangrenata, quies, mens sana mors.  
Ibid. n. 23 Dum aqua parum intra pericardium palpitacionis fuerat: si aqua multum & dytentionum tunc abest  
Ibid. n. 24 an n. 33 ostendit perbervationes nullum certum hydropis pectoris esse signum: Cum multi thoracis. 28

Aqua in pericardio  
Cum febre

Palpitatio Cor-  
dis ab aqua  
pericardii.

De Hydropoe  
Pectoris & pericardii, expag. 83. l.  
dii.

Vidi in nonagenaria apud Clevum Vincent brachii & polany meturanti oedema an-  
te mortem

— in Del'ile uxore: Crassa pingui, tuniculosa, catarrhosa, vomibus aliquando,  
pulsa singito abolito per tres hebdomadas ante mortem: placide jacebat, dormiebat.  
Oedema  
brachii &  
manus  
ante mortem

Oedema in manibus metaturis per paucos dies abiit placide  
Et in Principe Galtzin ante mortem hydropoe pectoris, Crurum abdominis lum-

brum manum dextram cum brachio adematorem paucis ante mortem diebus:  
Vide Morgagni Epistol. Lib. II. pag. 145 n.º 36 ubi ex Fontano, Buch-

noro & Vallalva similia oedemata observata fuisse.  
Galti videlicet fol. 8. n.º 23: 41. 44

N.º 44. pag. 148

Pleurisidii hydropis  
ex Albinis n.º 43. pag. 147. quae spina

N.º 46. pag. 150: Huc quoque per bagas demonstrari paginay, *Animi deliquia*  
Tussim, respirations difficultatem in pectoris & pericardii hydropoe prope-  
tue non esse: Pericelle perpendit varia & multiforme symptomata fieri ab aqua

quantitate, ab epi indole dum adhuc mutata non est, vel quando jam putreda  
ob mortem fuit facta: Confer corpus turgens. Conquire ut in Juvenibus, vel exchy-  
stem virentem, ut in Senescentibus, vel in Senibus: Quod ex faciei colore, ex causis  
motuum generantibus Constatuere licet: Sed dubia tandem signa sunt hujus mor-  
bi cum in quamplurimam adsint, & in totidem abint.

ibidem de Sisti, quae neque in hoc morbo perpetua.

ibidem de Leodem timore

ibidem de Aquae fluctuatione vel intra pectus vel pericardium

ibid: Contadescentia, tristitia, faciei pallor, oculi minus viridi  
facti, extrema corporis subfrigida — dubia

N.º 47. pag. 150. Ex Albinis ..... Pectus cordi imperitum: Sensus op-  
pressionis ex levi motu, & quasi cordis Constrictionis, Crescentis morbo, praecordii-  
rum anxietate:

N.º 48: huc legendy: cum signa Conjuncta recenseat, habet hujus signis petenda.

Fervoratio Sterni  
diminuida.

Epistole 17. pag. 152.

De Respiratione laesa, a cordis, aut Magnae arteriae intra thoracem  
aneurysmatibus.

Obsev. n.º Vi. n.º 8.º: n.º X.º n.º XII.º n.º XIV.

Flatibus per os  
emphy libabatur:  
putant aliunde tantum  
flatibus laborare

N.º XVI. Tenuis parte ab aneurysmate occupata, saepe oesophagus ita premi-  
tur, ut minime facile sit flatibus erumpendis via: Sed de flatuum causa  
alium silentium: Sed Medicos sapienter monet ne in morbi causam  
decipiantur, putantes aflatibus tantum originem ducere.

N.º XVII. Verderarii, & Libidinosi aneurysmatibus praecordii hominibus ma-  
gis bonoxii. aut Morgagni

N.º XXII. Ex Lancisio de Aneurysm. prope. A1 affect., de Cantum sponte oris  
aneurysmatibus plus quinquaginta in gulosis & bibulis se vidisse

N.º Suffocatione  
manus brachiaque  
in calente aqua im-  
movere & fricare

221. n.º 27. ibi. Col. 2.º ubi in suffocationibus prope mortem ab aneurysmate  
vel cordis vel aorta oriundis, tunc manus & brachia in aqua calente im-  
mersa frunda spajoni laxantur, evaditque quae sanguinis perficitur.

N.º 28. cor cum pericardio mole auctum diaphragma aliquando deprimis &

Lumborum  
dolor ad duo  
pharyngis  
mentis infen-  
ta  
Es  
hydropis cordis  
Epistole



Cor magnum

ventriculi morbo simulat; & pulsatio simulat illam, quae oritur sub hunc at arteria mesenterica, ut fit in hypochondriacis, qualem vidi unam in Mexico De'Foglie.

Cor magnum

N<sup>o</sup> 30 & 31. Pulsatione (vel cursu) orta, per signa aneurysmatis adeste, cum perit sit quiescentis (vel durum) & tenuissimus viret, cum aqua ad certum pondus, ut huiusmodi minueretur, succederet caput: tunc arteria aneurysmatica tunc in se collaberetur.

Arteria aorta

N<sup>o</sup> 32. in pectore opprobrium; suspicabantur aneurysma aortae: Sanguis mittitur. invito ego iterum mittitur: moritur ego: ut Balloiro accidit. Unde nunquam in morbo dubio invito ego exaceranda magna remedia: invito ego clyster simplex ~~non~~ iniecit chirurgus, moritur: vid. Act. Phys. Med.

Cor aneurysma

Epistol XVIII. p. 162.  
N<sup>o</sup> 2. Historia sutorii cordis aneurysmatici, arteria aorta descendente contracta; similis Squamulae aortae contractione

Contracta aorta

N<sup>o</sup> 3. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 4. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 5. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 6. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 7. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 8. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 9. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 10. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 11. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 12. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 13. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 14. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 15. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 16. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 17. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 18. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 19. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 20. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 21. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 22. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 23. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 24. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 25. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 26. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 27. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 28. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 29. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 30. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 31. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 32. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 33. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 34. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 35. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 36. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 37. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 38. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 39. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 40. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 41. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 42. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 43. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 44. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 45. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 46. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 47. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 48. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 49. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 50. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 51. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 52. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 53. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 54. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 55. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 56. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 57. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 58. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 59. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 60. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 61. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 62. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 63. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 64. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 65. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 66. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 67. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 68. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 69. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 70. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 71. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 72. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 73. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 74. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 75. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 76. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 77. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 78. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 79. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 80. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 81. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 82. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 83. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 84. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 85. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 86. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 87. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 88. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 89. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 90. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 91. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 92. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 93. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 94. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 95. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 96. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 97. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 98. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 99. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur. N<sup>o</sup> 100. Laborat vir quidam morbo tanquam incubo: e. M. paucum convalescere videtur.

ossificationis ca

N<sup>o</sup> 8. observat  
— 2D que ad n<sup>o</sup> 17. tracta de dilatactione cordis & Ventriculorum & aortae cum tuberculis aularum at

n<sup>o</sup> 33.

N<sup>o</sup> 17 tracta de Arteriae aortae aneurysmata: Notatu digna haec observatio aneurysmatis, quod repis signa cum illy hypochondriacis morbi confon-  
derantur: nam ab emphyse flatibus levamenti: Siquid huius arteriae aneurys-  
maticae signum est scilicet elatus clunibus reclinato capite deorsum:  
N<sup>o</sup> 24. Ex tubi forma protrusa: Ex frequenti & valida tuba inflatione.  
N<sup>o</sup> 28. Hic aneurysmatis aortae cum bractey opes: Vbi de ossificatione  
causa. usq ad 33 raverunt.  
N<sup>o</sup> 34. Hic aneurysmatis aortae descendente osses, unus flavus: Vbi sequenti numero  
multa, utique n<sup>o</sup> 32 de causa ossificationis.

Squamula  
aortae  
Alagria

Ossa aortae, intus  
cum tuberculis

Aneurysm.  
Causa. Top.  
sy. Hic

\*  
Philo. Ranyard.  
vol.  
Vbi multum omnes  
conscripti sunt.

Epistola XIX de Suffocatione: De Topi.

In hac Epist. de Suffocatione Suspendio: anatomica hepatis vena jugularibus: Suffocati  
in specu latentes intrantes; camisia & alia putrida loca: Submersione aquarum n<sup>o</sup> 40  
Infantibus intra vel extra uterum Suffocati

Polypus

Epist. XX  
De Pleuritide, Latum & Dors. dolore  
in peripneumonia ad n<sup>o</sup> 31. usque intente in dextro ventriculo auricula, vena  
que in cav. polypus. vide observationes ibi  
N<sup>o</sup> 30. 32. 33. 35. 36. Quinque narrante pleuritide vita functi  
in quibus aqua in pulmonum cavitate pericardio quae congesta primum, in  
ventra fuit: decumbent simulabant hepatidem, peripneumoniae  
pleuritidem: orthopnoia, sputo aliquando sanguinea moriebantur:  
N<sup>o</sup> 42: adducuntur Arctei & Auliani loca in quibus de decubitu  
in dolens lateri faciliore, quam in sanum: Sed non semper hoc signum ve-  
rum, neque constans.

Pleuritides  
ad eam primum

Sine in lateri  
dolens.

Sedy Pleurum & Pleurum  
Epi. XX:

Et in hoc articulo, multos que alij superius palam apparet, venery  
Conjungi posse: non solum ab  
dolore, ad diem quoque, cum laterum, pectoris, & sinuque  
hy auctoribus sed auctoribus que ut a Celso Auliano lib. 2. Nat. c. 14.

Uterque dolor  
dolorum hepa-  
tis affectu, Conjun-  
ta cum alij pect  
oy.

Epi. XXI. pergo de Pleuris, laterum, Dors: Sermo

Sedem vlt pleura  
in calum indolere latus  
& tuberculo costis.

Aut & sicut peripneumonia mortuus: cordis tuberculis, vel hydaty vlt sinistro: auricula  
dilatata supra: arteria bronchiali aneurismatica: Aorta squamosa spij & a  
N. 6. Structor 30 ann. febre intermittente Cum rigore in peripneumoniam incidit: &  
2nde fibrilis sunt morbi multi qui progressu inflammationi pulmonum evadunt: &  
quod initio sine inflammatione apparet.

Pleuritides

Ab artic. VI ad 22.  
Infida & fere nulla signa lethali peripneumonia. Valguis morby & mort-  
art. 13. Aut inflammationem, quam negamus impantur pulmones prope mortem.

Infida peripneumonia  
signa, notha.

Ab artic. 13. Lani hystris cum pleura specia: de Crusta inflammatoria abun-  
tra vel presentia causale optima art. 21.

Pulmonis firmitas  
hepaty substantiam  
trentiens.

Articul. 27. ~~de Crusta~~ & 28: Attendit omnes pleuritides & peripneumonia Crusta  
nec, quibus palmo hepatis duntaxat maneat, mortuus fuisse ex sua, Valtat-  
vlt & Lulu a fonte: inflammationis signum: 22 de dubio veram inflama-  
tionem ibi inventam fuisse & mortem accersisse: puto ex putredine sori  
Sanguinis ortum transisse, & pulmones pro putredine Colapso Sanguine sub mor-  
do infarsisse, quo mors citior: sed hec discutenda adhuc. Cura curatorem  
methodum Clar. vlt non affert.

Crusta alba sanguis  
quid indicet imple-  
ritale vel peripneumonia  
notha.

Art. 35: 36: In his duobus observationibus, alij que phorby vlt pleuritides notha  
describuntur, notatu dignum est Crusta alba in Sanguine missa: & aqua in pec-  
toris Cavitate: inter pulmones pleuramque, inter cor & pericardium: Illam indicem  
Sanguinem fuisse in thalamo cordis dextro polyporum alij Concretionum digite. &  
Pulmonum corpus hepatis similians: quae graui, pondosi, nigri, ad Eademque & 3  
Art. 37: 38.

Sed implevitide locy  
affectus? pleuritides sine  
dolore:

Pleuritidum Sedy pulmones potius quam pleura: Pleuritides Epidemicas cum  
dierum simul putredinis maligni morby effectus.

Mediastini & pericar-  
dii infla in alij

Art. 46: In hoc & de Mediastino & Pericardio dum inflammatione ex-  
ripiuntur: ex Falio & eruditione ut solea, sed perplexissime.

Ab aneurysmate Pecto-  
ris dolor pleuriticy le-  
thali.

Art. 47: & 48: Observationes duae, ubi cauti de bonis effe quando dolores  
pectoris tractamus: quj erit in memoriam aneurysmationis signa in me-  
moriam revocare.

Epi. 22. De Spitu Sanguini, purulento & 3

Lues Venerea: Cau-  
sa multiplex pulmony  
putridorum

Art. 5 ad calcem: Monachus spitu sanguini, cui tres germani fratry hoc mibo  
mortui: filii Armani hominy, Italiae que famine  
Ego observavi illos tam masculo, quam femine, qui a parentibus lue  
Venerea vlt infecti, in finem sanguini ab etate 17 a 28 Labores  
morti.  
Art. 11 ad calcem. ibi de effectu Luei Venereae in pulmonibus.

De Equitatione in ph-  
this: De Causa vlti  
fibrillatione

Art. 13. Contra Sydenham. Diffusi Epi ad Cole qui in phthisi equitationem  
suadebat: & Sanctor. in Art. Medic. Galen. qui in simili morbo conueneri  
videt

Signa phthisis  
pulmonis

Signa phthisis  
pulmonis

Signa phthisis  
pulmonis

Signa phthisis  
pulmonis

Art. 18: 19: 20.

Art. 20: 21.

Art. 22.

Art. 24.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

Ex glandulis collis tunc  
di. deperit poterit pul  
monis, cyrtosque eorum  
laborem mortis phthisi  
causa

Art. 24. observationes de phthisi orta ab ulcere apertis arteriis, quae cum  
signa videntur ex Aetio, (quem vide). vbi in eodem tractu Historia curati  
pulvae mediche phthisi & haezicis sublingualibus. Curati, sed per multos annos sopi  
genuerit humores per caton sparsis, pedis advenit; evanescit, ventrem loquitur mors. (et  
interdum esset tractatus & ex arte curatus. deinde curatus)

Art. 31. It de phthisi spuria curata ex supposito porce pectory: ex L. V. audimus  
affirmare eorum duxisse sputa illa, murem, trifidum & similia eorum.

Ex glandulis collis tunc  
di. deperit poterit pul  
monis, cyrtosque eorum  
laborem mortis phthisi  
causa

Art. 24. observationes de phthisi orta ab ulcere apertis arteriis, quae cum  
signa videntur ex Aetio, (quem vide). vbi in eodem tractu Historia curati  
pulvae mediche phthisi & haezicis sublingualibus. Curati, sed per multos annos sopi  
genuerit humores per caton sparsis, pedis advenit; evanescit, ventrem loquitur mors. (et  
interdum esset tractatus & ex arte curatus. deinde curatus)

Art. 31. It de phthisi spuria curata ex supposito porce pectory: ex L. V. audimus  
affirmare eorum duxisse sputa illa, murem, trifidum & similia eorum.

Palpitationes hy  
teriac III sine vi  
tio cordis, neque  
vulgarium

Palpitationes  
causa

Palpitationes  
aerum  
et asphyxia  
art. sequenti

De Pericardii ad  
haesione ad cor

Epistola XXIII De Palpitatione & dolore Cordis

Art. 2. Observationes: Il me semble que la cause de la mort de ces femmes a été la saignée  
dans une palpitation qui provenoit de l'atonia spirituum) ad art. viij 7.

Art. 3 & 10 legy morbos valvularum  
aeriacae  
domant efferae furi valvulae, quin palpitatione Cordis vlla appareat. vid. art. 12  
Neque pulsuum intermissis, neque inaequalitas.  
vid. Art. 12 § 2. ex Vieussien, Raynaud, Hallero Valvulae myxistaly efferae

Art. 13 legy vicia valvularum mitralium sine vlla palpitatione Cordis.  
Sed furi potuit ut palpitatione fiat valvulae, vel arteriae efferae facti: art. 14  
Art. 15. De Vermibus in tra Cor dubitat, tantum in Ventriculo cordis  
contingit. Lowen de vermibus cordis in dubium vertit. Heparty verumem  
lethalem leges apud Medical Essays & Inquiry tom: 1.

Art. 17 neque palpitationis causa est: sed praecordium opprobrium &  
Huc valde dicit Epistola lententiam de Senae Traise de Ceur tranery, & suam cum hup  
Art. 13 Exat oblatio. Pulsus minimi debili, ad vniuersum hypochondrium dolores  
Cum respiratio defecti, & animi deliquit frequentibus. Pericardii aqua & Cor magnum  
in caudam, quae illorum pulsuum causam accusans.

Ineruy convul  
sy. A referi.

Valvularum mibi

Pulsuum natu  
ralium Ambo  
rum abolitio

Art. 14

Art. 14

Epist. XXIV. Depulsibus, asphygia &  
Ad art. IX tractat de asphygia naturali. Morbora que. Sciens Medici furi popu  
ut sanus sit homo sine pulsuum motu, tanquam illi qui sub aqua mortui fore  
varent: exploratv collis inunqy pely ~~interdum~~ tarsi (ut mones Amatus Ligeti  
vix) quomv Morgagni Quod mortui, cum omnia fore legio medica non rari  
debet: fit morbo a pulsuum abolitio cum debilitate vix, motu salu debilitaty  
artum vitalium signis. Ex pulsu, agnoscere morbo perdifficile, Solo.  
Art. 13 Exat oblatio. Pulsus minimi debili, ad vniuersum hypochondrium dolores  
Cum respiratio defecti, & animi deliquit frequentibus. Pericardii aqua & Cor magnum  
in caudam, quae illorum pulsuum causam accusans.

Asphygia pericardii  
Cor magnum  
vid. eorum hic  
art. 12

Art. 13 Exat oblatio. Pulsus minimi debili, ad vniuersum hypochondrium dolores  
Cum respiratio defecti, & animi deliquit frequentibus. Pericardii aqua & Cor magnum  
in caudam, quae illorum pulsuum causam accusans.

Art. 20

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 24

Polypus: hup  
art. 24

Vermes cordis  
an sint? quia pulsuum  
mutaciones.

Vermes cordis  
an sint? quia pulsuum  
mutaciones.

Vermes cordis  
an sint? quia pulsuum  
mutaciones.

Vermes cordis  
an sint? quia pulsuum  
mutaciones.



Plancius Epist. de Morb. in Int. Bononiens. Hist. n° 30 air, Arteriam  
 magnam, velut ulceram, & contractam, variis partibus calentem ... quod sepe dicitur  
 vari in alijs cadaveribus, eorum praeteritum, qui Syphilide laborarunt, & ad aneurys  
 ma aorta, vel ad peccorij hydropem sunt dispositi. arteria aorta  
ulcera &c.

Epistol. XXVIII de Deglutitione lesa.

Causae multae narrat: vitio palati, laryngis pharyngis, oesophagi cum glan-  
 dulis, cartilaginibus, chondrogmaty, hepatis praegrandis, opusculorum &c. multa  
 ex his, quae deglutitionem impediunt ab illo praevio multo malo, praepotere conuulsi.

Epist. XXIX.

De Singultu, de diminutione humorum, de Ventriculi dolore

Singultus n° 3. Gnat-Hallorum opus. Pathologica Observationes XV Historia III pag. 31. Vbi von Vbi infla  
 triculum inflammatum praeteritum adligeretur os & for. nigrum, Singultus imperipnae mao. causa  
 moria erat glidum.

Dolor vti & von N° 6. Perbelli observatio in cadavere facta: a scirrho primam ventriculi in cancrum Scirrh. &  
 musis desinens, motus fuit. cancer vti.

Vti tumor in ppi N° 12. Vomitus glandula & que aucta. Vti vlt  
 mam suppurationem. N° 13 observatio de ulcere & foramine Ventriculi in Vela cum tumore dex  
 tati ventry in ovario sedem habent: nausea, &c.

N° 20. observatio: Ventriculi ulcera, oesophagi quae, cum ventriculi sinistramundi conatus  
 Sponium Anurij peristibz Confij, & laterisum dilatationem, quae Spuria vocantur Anurij mata. Vlcera  
 ma.

Epistola XXX de Vomitu

N° 2. Vomitus fuliginosus ex cancro Ventriculi cum dolore. Cancer vti.

Febry Vertian a- N° 4. 17° morbus cum vomitu chocolato Colorem referens, Convulsionibz, cui cor  
 duplex tex parvianus exhibet non fuit. Pancreas, & vesica  
 N° 7. a Vesica filia crassissima, pancreas ad Scirrhum vergente. Historia Matrond. & n° 10  
 a pancreate Scirrhoso, Cancro fore, ortus Vomitus. fellea confijoria.

n° 12: Expancreate, nigricante, Scirrhoso Quodeno que. Vom  
 n° 14: Ex hepate Scirrhoso: Pancreate Siccissimo, ad pylorum callosu ventriculz; (Cancer  
 D. Nicolai Strayburgi)  
 Reliqua ad § 22. Historia de Vomitu ex venum cauleto, ex hepate Scirrhoso, &  
 pancreate & phyloro affectis.

Epistola XXXI. de Alvi Profluvij

Epistolae XXXII: (Epist. XXXIII) De Alvi adhaesione & Hemorrhoidibus

Ep 33: De Scirri Intestini prolapsu.  
 In his sedy visio declamatur: & tunc a relaxatiz col. celulz, tunica quae hujus in  
 toriore, quem motum ad Vnguem leges deus. primum tom. 2° Observationes Medicae &  
 Liberary Edimburghensium: Remedia erunt digity colapsu hemorrhoidy in  
 sedem intrudere per singulas sedy; & ardore rectro laccio introito sedare: hoc  
 onco jam vngiti & vltima adhine annij Vitam taho: Reliqua remedia  
 seu instrumenta est relaxationem Contineant, noxia puto. remedia in  
 sedy relaxatio-  
nem

De dolore Intestinorum. 26 de Hæc, &amp; Coli doloribus, &amp; De Hernia incarcerata

Mercurij Crudit  
X. 13

ta ut loqui amant Chirurgi.  
 sed initium morbi in hernia contipata alio celibet, sedebet, debet nam motu jam  
 protracto sequentissime accidit ut in gangrenam intestina incident, tunc mercurij  
 tuncq; rumpit in cavum ventris & sic sequitur, qua morbum proculdubio, accelerat.

Et n. 154. seq.  
de Hernia crudi

Et de Hernia ab intestinorum appendicibus vel a natura vel a morbo oris, luculenter  
 agitur.

n. 35. Sanguis  
intus susceptio

X. 35. Ex modo antea dictis videlicet: Hernia: Intussusceptione, Inflammatione;  
 & obocclusionibus: Circulo Scirrhus in Colo. Colon Scirrhus induratum; Sin-  
 gularibus Causis, Vermes: Urina, rupta vesica ob casum, in ventris cavum effusa  
 Intus, utero rupto, putrefacti Sanguis intestina irritando, valvuli Causa.

Epist. 35. pergit de Intus dolore

Hic de indurata A questionem agitur num gangrena Intestinorum præsertim tenuium  
 oriri possit sine febre, Inflammationeque intestini: quod plerique contendunt clari-  
 gangrenæ antecedere: sed experientia quamplurimum in cadaveribus capti constitit  
 multos ea putredine perisse præcedente tantum ventris dolore, acutissimo, Chronico  
 antea & obocclusionibus: Quia dolor hi in intestini tenuibus nonnum tantum sine  
 morbo, sanguine parum inculcato: fit tunc cordi periclitari, Urinaque paries dolent;  
 perit pars ac in ventris Sanguis fuisset, tunc lathaly gangrena fit.

Signa in his doloribus ventris lathaly n. 21. hujus epistolæ pere ab Alferno  
 celebrissimo Medico: 1. ventris tumor durus: 2. pulsus abolitio 3. Oculorum ut omnia  
 fere abolita, & infoliti quid occidit.

Epist. 36. De Tumore &amp; dolore Hypochondriorum.

Obser. de Hepate ventris Cavitatem implente, abscessu infima sui parte cum diaphrag-  
 mati connexo, rupto in thoracem; qualem apud Magistrum Bern. Steph. Alferno  
 vidi. Signa, tussis, macies, inflat pectus, Spuria guberna alba, & alba, sed posteriora  
 deficiunt in Anterioribus signa ut videtur n. hic. 5. & 6.  
 Lien, Hepas, Rens, tumentes, Scirrhi, maximi, dolores, pleuritidis & multa cau-  
 sare possunt Ventris mala.

n. 2. n. 4.

De Calculy

Epist. 37 De Ictero & de Calculis Biliaribus  
 Ex terrore, ex metu percussus quidam Icterus: in hepate sedis mali: Conval-  
 si morbi sunt.  
 Amplissima hic de Venia calculorum natura per longas paginas Sectio-  
 bus 53 ad nauseam usque. sed multa ad Diagnostica Ratio leguntur.

Epist. 38 De Hydrops in Genere &amp; Saccato



## Lingua Cancer.

Vide. Medical Commentaries by Asociety of Edinburgh. tom. 2<sup>o</sup> Part 111. pag.  
296. London. 1774. 8<sup>o</sup>.

Plumbum exhibet remedium frangit exhibit, Sanguifugij ad rinas  
applicat, sanguinem darg. copia vernuata, Curat Cancer.



Intra Uterum. Vide Conceptus. Vide Uterus. pag. 61.

Journal de Politique et de Littérature. N.° Septième 5 Mars 1775

Tom. 1 pag. 280 Par M. Languet. à Paris.

» Lettre de M. Nuch Chirur<sup>g</sup> de Troyes on Nittelburg, on Moravie, qui a

» été corrigée pour le Commandant B. Major de la Citadelle.

» Dans le premier jour d'Aout. 1773 Un soldat de 22 ans, fut at-

taqué de maux de Cœur lègers, depuis l<sup>a</sup>. avec accidens succedant l'un fleurdu Ventre: on le traita Comme Hydropique .... le ventre grossissoit .... Le 3Janvier 1774 sentit du Vuy douleur dans la region Lombaire .... le doublement

mentale .... on lui a fait la ponction du Ventre, il n'en sortit rien, le malade

mourut après 37 heures de souffrance ....

» On a ouvert le Cadavre: à l'ouverture du Cadavre &amp; de l'abdomen

» On aperçut Un Kyste; ouvert, on y trouve Un fœtus mâle mort &amp; bien

» Conformé, avec son placenta, le membran &amp; les eaux: C'étoit Une Ma-

» trice .... l'office regardoit l'Intestin rectum, avec lequel Elle communiquoit

» par Un petit conduit, en forme d'appendix; Il n'avoit que l'odeur d'Uterine de

» Commun avec le Sexe féminin. D'ailleurs il étoit parfaitement Homme in-

» térieur &amp; extérieurement. La position, les Ligamens de cette Matrice

» étoient dans l'ordre naturel: Les Vaisseaux Spermaticques abouffoient

» en partie aux Ovaire; l'autre partie Continuoit son chemin jus-

» que aux Testicules. .... On examina la forme du bassin; Elle étoit telle

» qu'elle doit être dans l'homme. Les Mamelles n'étoient pas grosses

» may Elles Contenoient du lait, &amp; leur areole étoit large &amp; noire.

» On se rappella que le Soldat s'étoit plaint plusieurs fois de mal

» sentir remuer quelque chose dans son ventre, et particulièrement 30 heures

» avant la mort.

» Il ne restoit aucun doute sur la manière dont cet homme

» pouvoit avoir engendré .... par S'en rendre plus Certain encore, on

» l'empara de son Compagnon de lit. On le mit aux fers, &amp; par d'y me-

» nager reiterer, on lui fit avouer, Ce que l'on soupçonnoit Violentement.

Je ne veux croire Ce fait: May je n'ose pas le nier.

